

2159
ASOCIAȚIA MEDICALĂ ROMÂNĂ

Farmacia

REVISTĂ A SOCIETĂȚII ROMÂNE DE ȘTIINȚE FARMACEUTICE

COLEGIUL DE REDACȚIE

Redactor responsabil :
Secretari :

CONF.DR. NICULINA MITREA
CONF.DR. ILEANA CHIRIȚĂ
FARM. RODICA BĂDESCU
DR.FARM. C. IUGULESCU

MEMBRI

Conf. Dr. D. BĂLĂLĂU, Conf. Dr. M. BOJIȚĂ, Prof. Dr. I. CIULEI, Prof. Dr. M. COTRĂU, Conf. Dr. AURELIA CRISTEA, Prof. Dr. C. CSEDO, Prof. Dr. ELENA CUREA, Prof. Dr. GH. DĂNILĂ, Prof. Dr. S. LEUCUȚA, Farm. V. MICH, Farm. Dr. C. MIRCIOIU, Prof. Dr. ST. MOISESCU, Prof. Dr. GH. MORAIT, Prof. Dr. H. POPESCU, Prof. Dr. ADRIANA POPOVICI, Prof. Dr. G. RACZ, Prof. Dr. I. SIMITI, Prof. Dr. V. STĂNESCU

1 - 2

IANUARIE - IUNIE 1993

S U M A R

	pag.
Cercetări privind caracterizarea unei noi baze de unguent ANETA VERBUȚĂ, MARIA GROSU	3
Combinatii complexe ale cuprului cu antibiotice de tip β -lactamic VICTORIA ALDEA	9
Aplicarea unor reactivi cromatografici la identificarea unor uleiuri volatile integrale INGRID LUX, H. POPESCU	15
Metode de evaluare <i>in vitro</i> a disponibilitatii farmaceutice a sistemelor terapeutice transdermice cu membrana de control SIMONA RAICU, ȘT. MOISESCU, LELIA LAZĂR, ADRIANA SUCIU	25
Tioureide N'-substituie ale acidului p-fenilsulfonilbenzoic. Nota II AL. MISSIR, ILEANA CHIRIȚĂ, CARMEN LIMBAN	33
Contribuții la analiza dihidralazinei. Noi metode de determinare cantitativă. Nota II CRINA-MARIA POPA, IOANA PRODAN	37
Cercetări privind modificarea unor constante biochimice la șobolan sub influența a zece noi derivați de aril-sulfonil-tiobenzamidă și derivați de aril-sulfonil-feniltiazoli DENISA MIHELE, ELENA CRISTEA, ELENA BIVOL, IOANA ȘARAMET	45
Formularea și prepararea unor comprimate de supt destinate tratamentului local al infecțiilor buco-faringiene RODICA MUNTEAN, VOICHIȚA MUREȘAN, DOINA ROMANA POP, C. POLINICENCU, V. CHIOREAN	51
250 ani de la atestarea documentară a primei farmacii orădene GH. MERMEZE	57
Recenzii, actualități, aniversări, comemorări, breviar.	

**Redacția : București, Str. Progresului, 10, Sect. 5,
VOL. XLI, NR. 1-2, 1993**

Din partea redacției

Apariția normală a revistei "FARMACIA", singura revistă științifică de farmacie din România, a fost întârziată datorită creșterii costului hârtiei și manoperei tipografice.

Aceste dificultăți financiare au impus comasarea unor numere trimestriale, reducerea conținutului lor corespunzător spațiului tipografic micșorat și creșterea costului fiecărui exemplar, fapt ce a determinat și o scădere a numărului abonaților.

Cu ajutorul unor sponsorizări, impasul a fost depășit, ajungând ca și acest număr să intre în tipografie.

Pentru asigurarea revenirii la o apariție normală, redacția își propune ca, fără să renunțe la exigența științifică proprie revistei, să facă un conținut mai atrăgător, să crească numărul de abonamente și să reducă prețul de cost prin creșterea tirajului la cel puțin 1000-1500 exemplare.

În acest scop, redacția face apel la toți farmaciștii care doresc ridicarea prestigiului revistei și profesiei să trimită spre publicare pe lângă obișnuitele lucrări științifice originale, informații din actualitatea farmaceutică, note asupra unor manifestări științifice, anunțuri de reuniuni, conferințe, congrese și altele.

Colegii din învățământul superior și din cercetare pot prezenta reviste ale presei farmaceutice internaționale, recenzii ale cărților de specialitate nou apărute, propuneri de reforme sau îmbunătățiri în învățământ, cercetare, tematici de examene, concursuri, cursuri de perfecționare, etc.

Ne adresăm și celor mai activi dintre colegii noștri, care au reușit prin muncă și perseverență să creeze societăți comerciale prospere; să sprijine prin donații apariția revistei "FARMACIA". La rândul ei, revista le poate găzdui opiniile asupra dezvoltării profesiei în noile condiții socio-economice ale țării și reclame realizate la un nivel grafic corespunzător.

Fiecare dintre Dumneavoastră poate contribui la redresarea și îmbunătățirea revistei "FARMACIA".

Vă așteptăm

REDAȚIA

ANIVERSĂRI, 1993

1. Profesorul Dr.doc.Al.Mavrodin,n.1.V.1899,împlinește 94 ani
2. Profesorul Dr.doc.Victor Ciocănelea,n.29.IX.1901,împlinește 92 ani
3. Acad.Milcu Ștefan,n.3/15.VIII.1903, împlinește 90 ani
4. Profesorul Dr.doc.D.Gr.Constantinescu,n.2.II.1909,împlinește 84 ani
5. Conf.Dr.N.Țuchel,n.29.XI.1911, împlinește 82 ani
6. Conf.Dr.doc.Cl.Brăileanu,n.20.III.1914, împlinește 79 ani

COMEMORĂRI, 1993

Din străinătate

1. Paracelsus Teophrastus B.von Hohenheim (1493-1541), 500 ani de la naștere
2. Lavoisier Ant.Laurent (1743-1794), 250 ani de la naștere
3. Justus von Liebig, (1803-1873), 190 ani de la naștere
4. Chatin Adolph (1813-1901), 180 ani de la moarte
5. Parmentier Antoine (1737-1813), 180 ani de la moarte
6. Tiffeneau Marc (1873-1945), 120 ani de la naștere
7. Maurice-Marie Janot (1903-1978), 90 ani de la naștere

Din țară

1. Scavinschi Daniil (?-1838), 155 ani de la moarte
2. Nicolescu Dimitrie (1843-1898), 150 ani de la naștere
3. Babeș Aurel (1853-1925), 140 ani de la naștere
4. Trausch Adolf (1836-1908), 85 ani de la moarte
5. Cantacuzino Ioan (1863-1934), 130 ani de la naștere
6. Nicolau Dimitrie (1863-1917), 130 ani de la naștere
7. Grigorescu-Elvir Vasile (1873-1959), 120 ani de la naștere.
8. Mihalovici Aristide (1877-1953), 40 ani de la moarte
9. D.M.Ionescu (1878-1969), 115 ani de la naștere
10. Gh.P.Grințescu (1878-1956), 155 ani de la naștere
11. Vorel Constantin (1883-1963), 110 ani de la naștere
12. Pamfil Gh. (1883-1965), 110 ani de la naștere
13. Belcot Emil (1883-1955), 110 ani de la naștere
14. Ionescu-Matiu Al. (1883-1975), 110 ani de la naștere
15. Ciogolea Gh. (1898-1977), 95 ani de la naștere
16. Teodorescu N. (1919-1973), 20 ani de la moarte
17. Monciu Dragoș (1917-1983), 10 ani de la moarte
18. Pușcaru Enache (1912-1988), 5 ani de la moarte

C. I.

Cercetări privind caracterizarea unei noi baze de unguent

ANETA VERBUȚĂ, MARIA GROSU
Facultatea de Farmacie Iași

Rezumat

S-a obținut o nouă bază de unguent hidrogelică dintr-un sort de polioxietylenglicol în proporție de 25%, gelificat cu glicerină, care s-a comparat sub aspectul unor proprietăți fizico-chimice și reologic cu baza de unguent preparată din sortul de polioxietylenglicol cu aceeași masă moleculară, de proveniență Hoechst, în aceleași condiții tehnologice.

Parametrii de caracterizare determinați au valori apropiate, uneori aceleași pentru ambele baze de unguent cercetate.

Summary

A new hydrogelic ointment base has been obtained, using a polyoxiethylenglycol of 25% percentage, gelatined with glycerine. It has been compared from the point of view of physical-chemical characteristics and aspect with the ointment base prepared from polyoxiethylenglycol, with the same molecular mass, of Hoechst origin, under the same technological conditions.

The determined parameters of characterization present close, and sometimes the same values for both bases of researched ointment.

- *Unguente*
- *Polioxietylenglicol*

Numeroase lucrări ale lui Gstirner /1/, Jaspersen /2/, Chalabala /3/ ș.a. din literatura de specialitate prezintă tablouri variate ale bazelor de unguent.

Realizarea continuă de noi excipienți soluționează probleme ca largirea gamei de compatibilitate, stabilitatea pe timp îndelungat a principiilor active și rezolvarea imperativelor terapeutice de acțiune la suprafață sau la distanță.

Imbogățirea permanentă a arsenalului de excipienți pentru unguente devine necesară și datorită apariției continue a produselor de sinteză terapeutic active sau cu rol adjuvant de tipul tensidelor. În acest context, am luat în studiu posibilitățile de valorificare în scop farmaceutic a unui polimer realizat la Combinatul Petrochimic Brazi.

MATERIAL ȘI METODĂ

Materialul cercetat este un sort polioxietilenic indigen gelificat în proporție de 25% cu glicerină anhidră. Rezultă baza de unguent pe care am numit-o convențional "baza B". Pentru comparație, am preparat în aceleași condiții glicerogel cu polimerul similar al firmei B.A.S.F. (Austria) - bază de unguent ce am notat-o convențional "baza A".

Ambele baze sunt de culoare albă, sidefoasă cu caracter filant mult mai pronunțat decât al vaselinei, fără miros, cu gust dulce; manifestă hidrofilie, sunt hidrosolubile, lavabile.

Aceste calități prognozează penetrația transepidermică bună a substanțelor active.

În vederea aprecierii calităților celor două baze de unguent le-am supus analizei fizice de structură microscopică în lumină polarizată. S-a utilizat microscopul S.R. 0211 - 67 IOR la care s-a adaptat lentila polarizantă. Mărirea a fost de 450x. Analiza microstructurii s-a făcut atât la bazele ca atare, cât și în amestec cu vaselină și lanolină în proporție de 10%.

pH-ul celor două baze de unguent a fost determinat la pH-metru electronic Radelkis, într-o soluție rezultată prin dizolvarea a 1 g unguent în 20 g apă distilată.

Caracterele reologice s-au apreciat prin evaluarea extensibilității, tensiunii limite de alunecare și penetrometric.

Cercetările extensometrice la unguente tind să evalueze specific capacitatea de întindere când acestea sunt supuse la acțiunea unor presiuni exterioare. În determinările noastre am utilizat extensometrul preconizat de A. Del Pozo și Sunné /4/ prin aplicarea greutății de 200 g, timp de 1 minut, conform definiției indicelui de extensibilitate după J.M. a Sunné /5.6/. Calculul suprafeței elipsoidale ocupată de unguent s-a făcut conform formulei dată de Cerezo /7/.

Gradul de consistență al bazelor propuse de noi l-am evaluat penetrometric utilizând un penetrometru cu con, reprodus la nivelul laboratorului de Tehnică farmaceutică Iași după unele date tehnice ale penetrometrului automat AP 4/2 R.U. folosind un recipient cilindric, cu dimensiunile 5/16 cm. Penetrometrul utilizat este un con de oțel cu greutate de 125 g, înălțimea de 43,8 mm, generatoarea (G) de 46,2 mm și raza (R) de 14,75 mm. S-a determinat înălțimea și volumul conului penetrat.

Rezistența unguentelor la ungerea pe piele sau mucoase am evaluat-o prin determinarea tensiunii limită de alunecare. Acest parametru reprezintă rezultanta în echilibru a forțelor de coeziune intermoleculară pe secțiunea unguentului care, depășită de o forță exterioară ce acționează asupra unguentului, apare ca o rezistență împotriva tendinței de

alunecare a straturilor de unguent, provocând forfecarea acestora. Folosind un dispozitiv reprodus la Laboratorul de Fizică Iași după indicațiile din literatură /8/, valoarea tensiunii limite de alunecare s-a calculat după relația:

$$\theta = \frac{G_{\text{maxim}} + g_{\text{tal}} - f}{S} \cdot 981 \text{ dyne/cm}^2$$

unde: θ = tensiune limită de alunecare în dyne/cm²

S = suprafața unguentului întins pe lamele de sticlă

f = corecția rulmentului

g_{tal} = greutatea talerului

G_{maxim} = greutatea pe taler în momentul când lama alunecă

Precizăm că am calculat forța totală de frecare ce are loc în dispozitiv găsind valoarea de 3,2.

Suprafața de aplicare a unguentului a fost de 20,3 mm².

Grosimea stratului de unguent între cele două lame determinată micrometric, a fost de 1,6 mm.

Pentru toleranța biologică locală, s-a aplicat prin masaj la un lot de 10 șobolani, de două ori pe zi fiecare din bazele de unguent, după o tehnică determinată. Pentru analiza comparativă a influenței histologice la pielea de șobolan s-a aplicat la același animal, pe piciorul stâng, baza A și pe piciorul drept, baza B. În urma rezultatelor favorabile obținute la examenul pe animal (raportate într-o altă notă) s-a aplicat în Clinica Dermatologică Iași pe pielea umană sănătoasă timp de 14 zile, câte 0,5 g unguent pe o suprafață de 8 cm².

REZULTATE ȘI DISCUȚII

La analiza microscopică s-a pus în evidență structura gelică atât la bazele ca atare, cât și la asocierile cu lanolină sau vaselină. Structura de rețea a fracției solide este omogen arborizată.

În tabelul I se prezintă valoarea indicelui de extensibilitate al bazelor ca atare și în asociere cu principalii excipienți (lanolina și vaselina), la temperaturi diferite.

Din tabel se constată că baza B, indigenă, are o extensibilitate ușor redusă față de baza A. Vaselina crește indicele de extensie la ambele baze, iar lanolina îl reduce sensibil. Se constată analogie de comportament între baze, indiferent de temperatură.

Tabelul I

Indicii de extensibilitate

Baza de unguent	Ie ₁ (mm ²) la 20°C			Ie ₂ (mm ²) la 25°C		
	Proba			Proba		
	1	2	x	1	2	x
BAZA A	964	962	963	1020	1010	1015
BAZA B	886	882	884	980	984	982
Baza A + vase- lină 10%	998	996	997	1120	1140	1130
Baza A + lano- lină 10%	950	954	952	1000	1110	1005
Baza A + ulei vaselină 10%	1000	1015	1012	1030	1040	1035
Baza B + vase- lină 10%	990	986	988	1020	1015	1017
Baza B + lano- lină 10%	930	926	928	960	956	958
Baza B + ulei vaselină 10%	980	978	979	1050	1040	1045

Valorile experimentale ale tensiunii limită de alunecare sunt prezentate în tabelul II.

Tabelul II

Tensiunea limită de alunecare (două determinări)

Baza de unguent	G _{maxim} (g)			θ (dyne/cm ²)
	G ₁	G ₂	G	
Baza A	75	80	77,5	36,98
Baza B	58	60	59	29,58

Din tabel se constată că determinările sunt reproductibile, ceea ce atestă omogenitatea bazei, iar forța de aplicare în vederea etalării bazelor de unguent este aproximativ redusă în cazul ambelor experimente.

Rezultatele experimentale ale determinărilor penetrometrice sunt prezentate în tabelul III.

Tabelul III

Determinări penetrometrice

Baza de unguent	Caracteristicile conului penetrant (mm)			
	g	d	h	v (mm ²)
Baza A	39	24,9	36,97	481,7
Baza B	37	23,6	35,1	433,6

unde: g = generatoarea; d = diametrul; h = înălțimea; v = volumul (conului penetrat în unguent)

Din tabel se constată că valorile penetrometrice ale bazei indigene sunt mult apropiate de cele ale bazei firmei B.A.S.F. și pot îndeplini aceeași funcție.

pH-ul bazei de unguent A a fost 5,85 iar al bazei B a fost 5,65. După preparare și în timpul celor 3 luni de conservare în care s-au făcut determinări, la urmărirea sistematică privind toleranța biologică pe pielea de șobolan și apoi pe cea umană nu s-au semnalat reacții secundare locale sau generale (cercetările histologice asupra influenței locale sau sistemice în urma aplicării bazelor A și B pe pielea de șobolan vor constitui subiectul unei alte comunicări).

CONCLUZII

S-au realizat două baze de unguent în concepție proprie: una fiind brevetată (baza A), iar baza B înscrisă la OSIM, prin cerere de brevet complementară.

Ambele baze sunt albe sidefoase, filante, hidrosolubile, lavabile, cu proporție mare de glicerină, motiv pentru care OSIM București le-a dat denumirea de "baze de unguent de penetrație".

Bazele de unguent A și B au valori ale indicelui de extensibilitate, penetrometriei și pH-ului apropiate, care se mențin în procesul conservării.

Prin compoziție și tehnica de preparare, bazele nu necesită conservanți, chiar după păstrare timp de 2 ani.

B I B L I O G R A F I E

1. GSTIRNER F. - Pharm.Ztg. 1960, 49, 1438
2. JARSPERSEN H.P. - Apt.Tzg., Schweiz. 1968, 7, 239
3. CHABALALA M. - Pharma International, 1979, 6, 528
4. DEL POZO, SUNNE J. M-a - Galenica Acta, 1955, 8, 7
5. SUNNE J. M-a, FRIGILS J., GARCIA GERNANDEZ M-a. P. - Congrese International de Ciencias Farmaceutica, Pisa 4-8 Sept. 1961, Extras XXI
6. SUNNE J.M-a-Internationale Kongres der Pharmaceutischen Wissenschaften, Münster, 9-14 Sept.1963, Extras XXIII
7. CERENZO A., SUNNE J. M-a - Ars Pharm, 1969, 10, 183-217
8. POPESCU C., PISLARASU NADEJDA, GHERGHINIU E. - Farmacia, Buc., 1965, 9, 557-567

RECENZIE

Otrava și viața

Prof.dr.doc.Marțian Cotrău

Editura Fundației "Chemarea", Iași, 1993, 168 p., 500 lei

Intr-un număr redus de pagini, profesorul de toxicologie M. Cotrău a adunat cele mai interesante povestiri și mărturii despre otrăviri celebre extrase din autori nu mai puțin celebri, din antichitate până în zilele noastre.

Expuse sub formă de "tablete" de o incontestabilă valoare istorică, literară și științifică, extrasele selectate de autor, versuri, proză sau prelucrări sunt deopotrivă de importante pentru cultura generală a fiecărui intelectual, dar și captivante pentru orice cititor.

Autorul aduce în paginile cărții sale extrase din autorii: Ovidiu, Pliniu cel Bătrân, Lucrețiu, Virgiliu, Homer, Plutarh, Platon, Aristofan, Diogene Laertiu, Titus Livius, Horațiu, Marțial, Juvenal, Suetoniu, Tacit, Shakespeare, Guicciardini, Machiavelli, Molière, Miron Costin, Neculce, Gasparus Kramer, Poë, Madame de Sevigné s.a.

Intervențiile autorului sunt discrete și deosebit de utile, mai ales în prelucrarea unor materiale.

Bibliografia numără 103 titluri.

Primul capitol este dedicat otrăvii și otrăvurilor, în care autorul face o trecere în revistă, istoric, cazurile clasice.

Cartea, deși științifică, este literară și instructivă și de aceea se adresează cititorilor de orice profesie și de orice vârstă.

C. I.

Combinatii complexe ale cuprului cu antibiotice de tip β -lactamic

VICTORIA ALDEA

Facultatea de Farmacie București

Rezumat

S-au obținut o serie de combinații complexe ale cuprului cu: meticilină, oxacilină, cloxacilină, carbenicilină, aparținând următoarelor tipuri generale: CuL_2 , $\text{Cu}_2\text{L}(\text{OH})_2$, $\text{Cu}_2\text{L}(\text{OH})\text{H}_2\text{O}$ și Cu_2L_3 .

Compușii obținuți au fost caracterizați prin analiză chimică elementară, măsurători de conductivitate electrică moleculară, determinări de momente magnetice, spectre electronice și de vibrație.

Pe baza datelor obținute s-au propus formulele de structură pentru combinațiile complexe prezentate.

Summary

A new series of copper complex combinations has been obtained: meticillinum, oxacillinum, cloxacillinum, carbenicillinum of a general type: CuL_2 , $\text{Cu}_2\text{L}(\text{OH})_2$, $\text{Cu}_2\text{L}(\text{OH})\text{H}_2\text{O}$ and Cu_2L_3 .

The obtained compounds have been obtained by elementary chemical analysis, by measurements of molecular electrical conductivity, by magnetic moments determinations, by electronic and vibration analysis/spectrum.

The obtained results confirmed the structure formula for the complex presented combinations.

Resumé

Ont été obtenu des nouveaux combinaisons complexes de cuivre avec: meticillinum, oxacillinum, cloxacillinum, carbenicillinum, de type generale: CuL_2 , $\text{Cu}_2\text{L}(\text{OH})_2$, $\text{Cu}_2\text{L}(\text{OH})\text{H}_2\text{O}$ et Cu_2L_3 .

Les composés obtenus ont été caractérisés par l'analyse élémentaire quantitative, des mesures de conductivité électrique moléculaire, des déterminations de moments électriques, d'analyse spectrale en IR et UV.

Les résultats obtenus confirment les formules de structure pour les combinaisons complexes présentés.

- Peniciline
- Combinații complexe ale cuprului

Literatura de specialitate semnalează un număr redus de studii referitoare la capacitatea cuprului de a forma combinații complexe cu peniciline și acestea numai în soluție. Datorită acestui fapt, ne-am propus efectuarea unui studiu în scopul stabilirii condițiilor de obținere și caracterizare a combinațiilor pe care acest element le poate forma cu:

metecilina, oxacilina, cloxacilina și carbenicilina.

Pentru a stabili natura combinațiilor care se pot forma în astfel de sisteme, sinteza a fost efectuată în condiții experimentale în ceea ce privește următorii parametrii: raportul componentelor, natura anionului, temperatura, timpul de menținere al combinației în mediul de reacție.

PARTEA EXPERIMENTALĂ

În urma cercetărilor efectuate, a fost obținută o serie de combinații complexe care se încadrează în următoarele formule generale:

CuL_2	(L = metecilină, oxacilină, cloxacilină)
$\text{Cu}_2\text{L}(\text{OH})_2$	(L = metecilină, oxacilină, cloxacilină)
$\text{Cu}_2\text{L}(\text{OH})\text{H}_2\text{O}$	(L = carbenicilină)
Cu_2L_3	(L = metecilină, carbenicilină)

Combinațiile obținute au fost caracterizate prin analiză chimică elementară, spectre electronice, spectre de vibrație, spectre de rezonanță electronică de spin, determinări de conductivitate electrică moleculară, determinări de momente magnetice.

Din examinarea rezultatelor obținute, referitoare la natura speciilor separate, în corelație directă cu condițiile experimentale se desprind următoarele tendințe privind contribuția parametrilor menționați:

- deși raportul componentelor Cu^{2+} : L realizat în amestecul de reacție a fost același pentru toate sistemele considerate, anume Cu^{2+} : 2 L, combinațiile separate au compoziții diferite, corespunzătoare formulelor indicate;

- natura speciei separate pare să nu depindă de anionul sării CuX_2 , astfel folosind CuCl_2 , CuSO_4 , $\text{Cu}(\text{NO}_3)_2$, se obțin combinații de tipul CuL_2 , în timp ce combinațiile complexe rezultate în urma reacției penicilinelor cu acetatul de cupru sunt de tipul Cu_2L ; această diferență în comportare ar putea fi atribuită pH-ului realizat în mediu de reacție. Astfel, în cazul folosirii acetatului de cupru, pH-ul mediului de reacție este cuprins între 6 - 6,5, în timp ce pH-ul soluțiilor rezultate în cazul folosirii celorlalte combinații ale cuprului, este cuprins între 2,5 - 3.

- compoziția acestor combinații, în sensul raportului molar Cu^{2+} : L realizat, pare să depindă de timpul menținerii combinației respective în mediul de reacție.

Astfel, în cazul reacției metecilinei cu: sulfat, clorură sau azotat de cupru, combinația separată imediat din mediul de reacție corespunde unui raport al componentelor de 1 : 2, pe când menținerea combinației în soluție circa două ore conduce la un raport molar al componentelor de 2 : 3, combinația separată fiind de tipul Cu_2L_3 .

Sinteza combinațiilor complexe ale cuprului (II) cu cele patru peniciline în domeniul de temperatură 20-40°C, nu determină modificări în compoziția acestora, ci numai în viteza de reacție.

REZULTATE ȘI DISCUȚII

Conductivitatea electrică moleculară.

În scopul confirmării formulării atribuite combinațiilor studiate au fost efectuate determinări de conductivitate electrică moleculară. Rezultatele au fost interpretate pe baza datelor existente în literatură, referitoare la limitele între care se încadrează valorile conductivității pentru diferitele tipuri de electroliți.

Din examinarea datelor, cu privire la conductivitatea electrică moleculară determinată folosind soluții metanolice și în dimetilformamidă, rezultă că acești compuși sunt neelectroliți.

Spectre electronice

Caracteristic pentru combinațiile complexe ale Cu(II) este faptul că acestea nu adoptă o structură geometrică perfectă. Astfel, în cazul combinațiilor tetracoordinate, determinările structurale exacte arată că atât cele cu structură tetraedrică, cât și cele cu structură plan-pătrată prezintă totdeauna distorsiuni apreciabile de la structurile geometrice perfecte.

Majoritatea combinațiilor complexe ale cuprului(II) studiate în această lucrare prezintă o singură bandă de absorbție și un umăr, de regulă la energii mai scăzute. Din examinarea spectrelor electronice în reflexie, înregistrate pentru combinațiile penicilinelor studiate cu ionul de cupru, se pot face următoarele aprecieri:

- banda care apare la circa 13200 cm⁻¹ și umărul care apare la circa 11500 cm⁻¹ în spectrele compușilor de tip CuL₂ pledează pentru o configurație octaedrică. Această afirmație este sprijinită și de valorile momentelor magnetice cuprinse între 1,89 și 1,93 MB, care sunt normale pentru ionul de Cu(II) într-o înconjurare octaedrică /1/.

Pentru combinațiile Cu₂L(OH)₂ și Cu₂L(OH)H₂O, la obținerea cărora s-a utilizat acetatul de cupru, datorită hidrolizei ionului acetat, pe baza informațiilor din literatură /2/ este de așteptat o hidroliză a ciclului β-lactamic din molecula antibioticului, determinată de prezența ionilor HO⁻. În aceste condiții, devine posibilă coordinarea ligandului la doi ioni de cupru. Spectrele electronice înregistrate pentru aceste combinații caracterizate prin simplitatea lor pot fi interpretate pe baza unei înconjurări tetraedrice pentru ionul Cu²⁺, iar asemănarea lor indică aceeași structură.

Banda care apare la circa 15600 cm⁻¹, cu un umăr la circa 12100 cm⁻¹ în spectrele combinațiilor de tip Cu₂L, pledează pentru o configurație tetraedrică distorsionată axial. Valorile momentelor magnetice scăzute, cuprinse între 1,44 și 1,5 MB, indică o interacție între ionii de cupru situați într-o înconjurare tetraedrică.

Spectre de vibrație

Pentru a obține date suplimentare referitoare la stereochemia

combinațiilor studiate, în special pentru a stabili modul de coordonare al liganzilor, au fost înregistrate spectrele lor de vibrație.

Din examinarea poziției benzilor în spectrul liganzilor liberi ca și în spectrele combinațiilor de cupru, se desprind următoarele:

- banda amidă I, care la antibioticele lactam-tiazolidinice în stare liberă apar în regiunea $1640-1675\text{ cm}^{-1}$ sub forma unei benzi largi, se deplasează în spectrele compușilor de cupru spre numere de undă mai mici.

- în domeniul în care apare banda amidă II ($1492-1550\text{ cm}^{-1}$) se constată deplasarea benzilor către numere de undă mai mari în spectrele tuturor combinațiilor studiate astfel.

- o situație asemănătoare se constată referitor la banda amidă III și anume deplasarea acesteia către numere de undă mai mici.

Al doilea domeniu spectral important din punctul de vedere al elucidării structurii combinațiilor studiate este acela în care absorbția este atribuită vibrațiilor scheletului lactam-tiazolidină, din examinarea cărora se desprinde următoarea concluzie: benzile care apar în domeniul $1070-1130\text{ cm}^{-1}$ sunt deplasate în spectrul combinațiilor de cupru către numere de undă mai mari.

Cel de al treilea domeniu spectral important este regiunea în care absoarbe grupa carbonil. De obicei, frecvențele de întindere δ ($\text{C}=\text{O}$) apar în regiunea $1600-1800\text{ cm}^{-1}$.

În urma formării combinațiilor complexe frecvențele grupării carbonil-lactamă sunt puternic afectate după cum urmează: o deplasare către numere de undă mai mici în spectrele combinațiilor $\text{Cu}(\text{met})_2$ și $\text{Cu}(\text{met})_3$, o deplasare către numere de undă mai mari în spectrele combinațiilor $\text{Cu}(\text{clox})_2$ și $\text{Cu}(\text{oxa})_2$ și dispariția acestor benzi în spectrul celorlați compuși: $\text{Cu}_2(\text{met})$, $\text{Cu}_2(\text{oxa})$, $\text{Cu}_2(\text{clox})$, $\text{Cu}_2(\text{carb})$.

Din examinarea spectrelor de vibrație ale combinațiilor studiate comparativ cu spectrele liganzilor liberi, se pot desprinde câteva concluzii asupra celor mai probabile centre de coordonare ale penicilinelor la ionul de cupru și anume:

- a) în cazul combinațiilor de tip CuL_2 , atomii donatori par să fie:
 - oxigenul grupării β -lactamă;
 - azotul grupării amidă și
 - oxigenul din gruparea metoxi în cazul meticilinei și respectiv oxigenul grupării amidă în cazul oxacilinei și cloxacilinei.
- b) în cazul combinațiilor de tip CuL_2 , atomii donori pentru cei doi ioni metalici sunt:
 - oxigenul metoxi (la meticilină) sau oxigenul carboxil (la carbenicilină) sau oxigenul amidă (la oxacilină sau cloxacilină);
 - azotul amidic;
 - oxigenul grupării β -lactamic (care în urma hidrolizei a devenit grupare carboxil, cu ruperea legăturii C - N din ciclul β -lactamtiazolidinic; respectiv:
 - cel de al doilea oxigen din gruparea carboxil (provenit din gruparea β -lactamă);
 - azotul din ciclul β -lactamtiazolidinic și
 - un oxigen al grupării carboxil existent inițial.

Sinteza complexelor

$\text{Cu}(\text{meticilină})_2$. La soluția obținută prin dizolvarea a 1 g meticilină în 5 ml apă distilată se adaugă o soluție obținută din 0,2 g clorură de cupru, 0,3 g azotat de cupru sau 0,3 g sulfat de cupru și 5 ml apă distilată. Se obține o substanță de culoare bleu-verde care este filtrată imediat, spălată cu apă distilată și uscată la temperatura camerei.

Cu₂(metecilină)₃. Dacă substanța bleu-verde obținută din sinteza anterioară este menținută în soluție cel puțin trei ore, se observă o modificare a culorii care devine verde închis. Substanța este separată și spălată cu apă distilată.

Cu₂(metecilină). Se dizolvă 1 g metecilină în 10 ml apă distilată. La această soluție se adaugă soluția obținută din 1 g acetat de cupru dizolvat în 10 ml apă; în timp se separă o substanță de culoare verde care se intensifică până la verde-negru. Substanța este separată după 24 de ore, spălată cu apă distilată și uscată în aer.

Cu(oxacilină)₂. La soluția obținută prin dizolvarea a 1 g oxacilină în 10 ml apă se adaugă soluția obținută din 0,2 g clorură de cupru, sau 0,3 g azotat de cupru, sau 0,3 g sulfat de cupru și 10 ml apă. Se obține o soluție de culoare bleu care se filtrează iar substanța separată se spală cu apă.

Cu₂(oxacilină). Se dizolvă 1 g oxacilină în 10 ml apă. La această soluție se adaugă soluția obținută din 1 g acetat de cupru dizolvat în 10 ml apă. Substanța verde obținută este separată prin filtrare după cel puțin 3 ore. Este spălată cu apă distilată și uscată în aer.

Cu(cloxacilină)₂. La soluția obținută prin dizolvarea 1 g cloxacilină în 10 ml apă se adaugă fie soluția obținută din 0,2 g clorură de cupru dizolvată în 10 ml apă, fie soluția obținută din 0,3 g sulfat de cupru sau 0,3 g azotat de cupru în 10 ml apă distilată. În toate cazurile se obține o substanță de culoare bleu-intens, care se separă și se spală cu apă distilată.

Cu₂(cloxacilină). Dacă la soluția de cloxacilină 1 g în 10 ml apă se adaugă soluția de acetat de cupru (1 g) în 10 ml apă se obține o substanță de culoare albastru-deschis, care imediat își schimbă culoarea ajungând la verde-închis. După filtrare și spălare cu apă distilată substanța este uscată la temperatura camerei.

Cu₂(carbenicilină)₃. La soluția obținută prin dizolvarea a 1 g carbenicilină în 10 ml apă se adaugă soluția obținută prin dizolvarea a 0,2 g clorură de cupru în 10 ml apă, sau soluție obținută din 0,3 g azotat de cupru dizolvat în 10 ml apă. Se formează o substanță de culoare bleu-verde care este separată prin filtrare, spălare cu apă distilată și uscare.

Cu₂(carbenicilină). La soluția de carbenicilină obținută dintr-un gram de substanță în 10 ml apă se adaugă soluția de acetat de cupru, 1 g substanță în 10 ml apă. Se separă o combinație de culoare verde după cel puțin 3 ore și se spală cu apă distilată.

Datele analizei cantitative sunt prezentate în tabelul I.

Tabelul I

D a t e a n a l i t i c e

Combi- nația	Cupru %		Carbon %		Azot %		Sulf %	
	calc.	găsit	calc.	găsit	calc.	găsit	calc.	găsit
$\text{Cu}(\text{met})_2$	7,02	7,17	45,11	49,45	6,19	6,07	7,07	7,48
$\text{Cu}_2(\text{met})_3$	9,16	9,89	44,16	53,60	6,05	6,17	6,91	5,44
$\text{Cu}_2(\text{met})$	23,20	24,04	37,23	32,25	5,11	4,85	5,86	6,71
$\text{Cu}(\text{ox})_2$	6,65	6,89	48,29	49,32	8,87	8,62	6,77	7,28
$\text{Cu}_2(\text{ox})$	22,32	23,21	40,14	45,71	7,38	7,50	5,63	5,71
$\text{Cu}(\text{clox})_2$	6,20	6,19	44,90	42,23	8,26	7,92	6,30	6,23
$\text{Cu}_2(\text{clox})$	21,06	20,95	42,30	42,30	7,79	7,81	5,93	6,17
$\text{Cu}_2(\text{carb})_3$	9,10	9,10	43,96	43,08	6,02	6,30	6,88	7,11
$\text{Cu}_2(\text{carb})$	23,11	23,82	37,13	35,92	5,09	4,97	5,82	5,78

CONCLUZII

Au fost sintetizați 9 compuși ai cuprului cu antibiotice de tip β -lactamic. Acești compuși nu sunt citați în literatura de specialitate cercetată. Structura propusă a fost confirmată de rezultatele analizei cantitative, spectre electronice, spectre IR și conductivitate electrică moleculară.

B I B L I O G R A F I E

1. TOMLINSON A.A.G., HATHAWAY B.J.J. - Chem.Soc. 1968 (A) 1685
2. NIEGEL P., GERSMANTEL A., PROCTOR P., PAGE M.J. - Chem.Soc.1980 (II) 1725

Aplicarea unor reactivi cromatografici la identificarea unor uleiuri volatile integrale

INGRID LUX, HONORIUS POPESCU

Facultatea de Farmacie, Cluj-Napoca. Disciplina de Farmacognozie, Fitoterapie și Istoria Farmaciei

Rezumat

Pe 15 uleiuri volatile au fost încercați mai mulți reactivi chimici diferiți. Acidul sulfuric, verdele de bromcrezol, vanilina, aldehida anizică și clorura de litiu, utilizate în anumite condiții, se comportă ca reactivi generali și specifici ai uleiurilor volatile.

Summary

More different chemical reagents have been tested on 15 volatile oils. The sulphuric acid, the bromgreen of chrezol, the vanillin, the anisic aldehyde and the lithium chloride, used under certain conditions, act as general and specific to volatile oils reagents.

Uleiuri volatile

Reacții chimice specifice

Până în prezent s-au izolat circa 3000 uleiuri volatile din care se utilizează aproximativ 150. Dintre acestea cam 50 sunt destinate uzului medicinal /7/. Oficiale în F.R. IX sunt 14; în lucrarea de față sunt luate în studiu 8 dintre acestea, precum și alte uleiuri volatile de proveniență românească.

Ideea identificării și caracterizării uleiurilor volatile integrale nu e nouă.

S-a experimentat interacțiunea acestor uleiuri cu metalele /10/, precum și cu aliaje ale acestora /12/, constatându-se că uleiurile volatile sunt foarte corosive.

Aceste experimente evidențiază unele proprietăți redox ale uleiurilor volatile, fără însă a le caracteriza specific. Mai târziu s-a pus la punct chiar un procedeu oxidimetric pentru determinarea uleiurilor volatile în condimente /3/.

S-a încercat determinarea nefelometrică a conținutului în ulei volatil la unele specii de Rosa și de Basilicum /2/, determinare care se bazează pe proprietatea nemiscibilității uleiurilor volatile cu apa. Această proprietate, de asemenea, nu le este specifică.

Capacitatea uleiurilor volatile de a da reacții de culoare a fost sesizată și în 1939 de către prof. Müller. Acesta experimentează reactivul EM (pDMABA în acid acetic glacial + acid fosforic în acid acetic glacial) pe 195 de uleiuri volatile și sugerează ideea ca această reacție să fie aplicată în scopul unor determinări cantitative. Cercetătorii de la Schimmel Berichte nu recunosc importanța acestei reacții decât în diferențierea geraniolului de nerol, respectiv a α -iononei de β -iononă /4/

În acest sens, reacția de culoare a mai fost aplicată și la diferențierea uleiurilor volatile, respectiv a pulberilor de *Ilicium verum* și de *Ilicium religiosum* /6/.

În 1984, se semnalează într-o lucrare aplicarea reactivului Schiff pe uleiuri integrale și pe amestecuri de componente cu scopul punerii în evidență a anumitor componente /9/.

Din acest punct de vedere, cromatografia pe strat subțire din acest domeniu se bazează pe proprietatea uleiurilor volatile de a da reacții de culoare cu anumiți reactivi, culori considerate stabile pentru respectivul compus /11/.

Pe de altă parte, uleiurile volatile nu sunt caracterizate ca grup general decât prin proprietăți senzoriale și constante fizice, în timp ce din punct de vedere chimic nu sunt semnalate ca reactivi generali decât tinctura de Alkanna și reactivul Sudan III /8/, care însă dau aceleași reacții și cu uleiuri grase.

După cum se va vedea în lucrare, uleiurile volatile se prezintă ca un grup de substanțe capabile să reacționeze chimic, astfel încât unii reactivi să poată fi considerați de interes general.

MATERIAL ȘI METODĂ

Uleiurile volatile pe care au fost efectuate cercetările au fost obținute de Întreprinderea Plafar din Orăștie din recolta anului 1990. Este vorba de următoarele uleiuri volatile: *Anisi aetherol.* (*Pimpinella anisum*), *Anethi aetherol.* (*Anethum graveolens*), *Carvi aetherol.* (*Carum carvi*), *Coriandri aetherol.* (*Coriandrum sativum*), *Foeniculi aetherol.* (*Foeniculum vulgare*), *Hyssopi aetherol.* (*Hyssopi offic*), *Lavandulae aetherol.* (*Lavandulae sp.*), *Melissae aetherol.* (*Melissae officinalis*), *Salviae sclareae aetherol.* (*Salvia sclarea*), *Thymi aetherol.* (*Thymus vulgaris*), *Ocimi basilici aetherol.* (*Ocimum basilicum*), *Abiei albae aetherol.* (*Abies alba*), *Juniperi aetherol.* (*Juniperis communis*), *Pini montanae aetherol.* (*Pinus montana*).

Ca metodă de lucru, uleiurile au fost aduse în soluție 10% în alcool etilic concentrat și tratate cu următorii reactivi: acid sulfuric concentrat, vanilină clorhidrică /13/, aldehidă anisică p.a., D.N.F.H. 0,4% în etanol /13/, resorcinol 1% în metanol /14/, acid acetic glacial p.a., clorură ferică 3% /14/, iod 1% în alcool concentrat /13,14/, fenolftaleină /14/, verde de bromcrezol 0,04% în etanol /13/, albastru de bromtimol /13/, azotat de argint 2% în alcool conc. /13/, molidat de sodiu 1% în acid sulfuric, metilorange 0,1% în etanol /13,14/, β-naftol 2% în etanol /14/, carbonat de litiu în acid clorhidric conc. și în alcool conc.+acid sulfuric 2 n /11/.

Pentru punerea în evidență a reacțiilor de culoare, obținute cu anisaldehida, acestea au fost repetate pe plăci godet (1 pic. soluție ulei volatil + 1 pic. soluție acid sulfuric în etanol 1% + 1 pic. anisaldehydă)

Pe lângă uleiurile menționate s-au făcut reacții similare, pentru comparație, pe α-pinen, linalool, *Oleum Helianthi* și *Oleum Olivae*.

REZULTATE ȘI INTERPRETARE

În tabelul I sunt date rezultatele reacțiilor

efectuate pe uleiuri volatile ale unor specii aparținând familiei *Umbelliferae*.

Tabelul I

Reacții de culoare ale uleiurilor volatile obținute din specii de *Umbelliferae*

Reactivi	Aeth. Anisi	Aeth. Anethi	Aeth. Apii	Aeth. Carvi	Aeth. Coriandri	Aeth. Foeniculi
Acid sulfuric conc.	inel roșcat	inel cărămi-ziu	inel brun-roșcat	inel brun	inel brun-roșcat	inel vișiniu
Vanilină clorhidrică	-	violet	roșu-brun	brun-vernii	gălbui	brun-roșcat
Anisal-dehida	gălbui	brun-roșcat	brun-roșcat	brun-roșcat	gălbui	brun-roșcat
β -naftol	-	-	-	-	-	-
Acid acetic glacial	-	-	separare în straturi	-	-	-
Clorură ferică	galben-verzui	portocaliu verzui	-	-	-	-
Iod	-	-	decolo-rează	decolo-rează	-	-
Azotat de Ag	-	-	-	-	nuanță roșietică	nuanță gălbuie
Molibdat de sodiu	albastru câteva sec.	albastru	albastru	opalescență	stratul inferior albastru	după 15 minute albastru
Verde de bromcrezol	galben	verde r albastru(c)	galben	galben (r) verde c	verde	verde
Albastru de bromtimol	decolorare	galben	galben	-	galben	galben
Metil-orange	-	-	decolorare	-	-	-
Rezorcinol	-	-	-	-	roz pal	-
Carbonat de litiu	roz (c) galben (r)	inel slab verzui	portocaliu	nuanță verzui	portocaliu	strat sup. brun, opal.brună

Legendă : c=cald; r=rece; Aeth.=aetheroleum;

In tabelul II sunt redade rezultatele reacțiilor efectuate pe uleiuri volatile de la specii din familia *Labiatae*.

Tabelul II

Reacții de culoare ale uleiurilor volatile obținute din specii de *Labiatae*

Reactivi	Aeth. Hyssopi	Aeth. Lavandulae	Aeth. Melissae	Aeth. Ocimi basil.	Aeth. Salviae sclareae	Aeth. Thymi	Linalol
Acid sulfuric conc.	inel brun	inel brun-roșcat	inel brun	inel verde apoi albastru	inel roșu-brun	inel roșu-portocaliu	vișiniu
Vanilină clorhidrică	vișiniu	violet	roșu-brun	violet-albastru	violet	violet apoi verde	vișiniu
Anisaldehyda	violet-brun	vișiniu	violet-roșu	verde-albăstrui	ruginiu	verde	violet verde brun
DNFH	-	-	-	-	-	-	-
Resorcinol	-	-	-	-	roz cu ac.sulfuric	-	-
β-naftol	-	-	-	-	-	-	-
Ac.acetic glacial	-	-	-	-	-	-	-
Clorura ferică	-	-	-	-	-	verde, dispăre la cald	-
Iod	decolorare	decolorare	decolorare	decolorare	decolorare	decolorare	decolorare
Azotat de Ag	-	-	-	-	-	-	-
Molibdat de sodiu	opalescență violet	albastru verzui	albastru verzui	-	inel verde pal	roșiatic	opalescență roz
Verde de bromcrezol	albastru(r) galben (c)	albastru(r) galben (c)	albastru(r) verde (c)	galben (r) verde (c)	galben (r) verde (c)	albastru(r) verde (c)	albastru(r) galben (c)
Albastru de bromtimol	verde (r) galben (c)	verde (r) galben (c)	verde (r) galben (c)	verde (r) galben (c)	-	verde (r) galben (c)	verde (r) galben (c)
Metilorange	-	-	-	-	-	-	-
Carbonat de litiu	roz	verde apoi roșu-portocaliu cu inel galben	gălbui	portocaliu pal	portocaliu-aprins	-	-

În tabelul III sunt redată reacțiile obținute pe uleiuri volatile provenite de la specii din ordinul *Coniferales*, iar pentru comparație sunt și reacțiile cu α și β -pinen.

Tabelul III

Reacții de culoare ale uleiurilor volatile
obținute din specii de *Coniferales*

Reactivi	Aetheroleum Abiei albae	Aetheroleum Juniperi	Aetheroleum Pini montanae	α -pinen	β -pinen
Ac.sul - furic conc	inel brun	inel brun	inel brun	inel brun	inel brun
Vanilină clorhidri- că	brun- violet	nuanță violet- portocaliu	brun- roșcat	brun	brun- roșcat
Anisal- dehida	verde, violet, portocaliu	portocaliu	bleumarina, verde, portocaliu	portocaliu violet, verde	violet, verde, galben
D.N.F.H.	se separă strat uleios, auriu	opalescen- ță brună	se separă strat uleios brun	-	-
Resercinol	-	-	-	inel gălbui	-
Acid acetic glacial	-	-	-	-	-
Iod	-	decolorare	decolorare	decolorare	decolorare
Azotat de Argint	-	-	-	-	-
Molibdat de sodiu	opalescen- ță portocalie	cald:roz brun	-	-	-
Verde de bromcrezol	albastru (r), galben (c)	albastru (r), galben (c)	albastru (r), galben (c)	albastru (r), galben (c)	albastru (r), galben (c)
Albastru de bromtimol	galben	galben	galben	-	-
Metil- orange	-	-	-	-	-
Fenol- ftaleină	-	-	-	-	-
β -naftol	-	-	-	galben	galben
Carbonat de litiu	galben- brun	roz	gălbui	verzui apoi galben	galben- brun

Analizând rezultatele din cele trei tabele se remarcă faptul că reactivii pot fi împărțiți în trei grupe:

I. toate uleiurile volatile reacționează cu acidul sulfuric, verdele de bromcrezol, cu anisaldehida și cu clorura de litiu (respectiv cu sulfatul acestuia)

II. o capacitate apropiată de reacție o prezintă vanilina cu 14 probe pozitive. Molibdatul de sodiu și albastrul de bromtimol reacționează cu 10 uleiuri, iar iodul cu 9

III. o capacitate mică de reacție prezintă clorura ferică (3 uleiuri volatile), D.N.F.H. și azotatul de argint (2 uleiuri volatile) și în sfârșit rezorcinolul (1 ulei volatil) Fenolftaleina, metilorange-ul și acidul acetic glacial fie că nu reacționează deloc, fie că (în cazul ultimelor două) dau reacții neconcludente.

Acidul sulfuric, verdele de bromcrezol, aldehida anisică, clorura de litiu încadrați în prima grupă ar putea fi considerați, prin comportamentul lor, ca reactivi generali și specifici ai uleiurilor volatile. Cu atât mai mult cu cât față de reactivii Sudan III sau tinctură de Alkanna - citați de alți autori ca reactivi generali - aceștia reacționează în mod diferit sau de loc cu uleiurile grase.

Vanilina dă colorații diferite: cărămiziu, violet, verzui fără ca acestea să fie foarte stabile - cel mai adesea în timp sau la încălzire se închid la culoare.

Aldehida anisică dă colorații brune de nuanțe diferite, nediferențiate și nu prea expresive cu uleiurile volatile de la umbelifere și de la conifere, dar cu labiatele apare o paletă întregă de culori (violet, verde, albastru, vișiniu) care în final se stabilizează. Acest fapt a determinat cercetarea acestei reacții pe placă godet unde rezultatele au fost similare cu cele din eprubetă. În ideea surprinderii curcubeului de culori ce s-au prefigurat în reacțiile în eprubetă, s-a încercat lucrul pe hârtie de filtru cromatografică unde s-a impus diluarea acidului sulfuric. Lucrând cu acid sulfuric 1% în etanol, s-au obținut colorații interesante, stabile și repetabile. Uleiul de lavandă apare în mod constant ca pată violetă, iar uleiul de salvie ca pată verzuie cu irizație roșie. Uleiul de melisă apare sub formă de pată violetă sau gri-verzuie.

Spre deosebire de anisaldehydă, clorura de litiu dă colorații interesante și cu uleiurile volatile ale umbeliferelor atât în eprubetă cât și pe hârtie de filtru unde s-a lucrat cu soluție de acid sulfuric 2n în locul acidului clorhidric concentrat. Reacțiile sunt repetabile, dar mult mai puțin stabile în timp.

Tabelul IV

Reacții cu clorură și sulfatul de litiu

Aetheroleum	Reacția în eprubetă Li_2CO_3 1% în HCl conc.	Reacția pe hârtie de filtru Li_2CO_3 1% în alcool + H_2SO_4 2n
Anisi	roz la cald galben la rece	pată gri cu irizație verzuie
Anethi	inel slab verzui	pată violet mai intensă la margine
Apii	portocaliu	pată galben-brună
Carvi	nuanță verzuie	irizații brun- roșiatice
Coriandri	portocaliu aprins	galben-portocaliu
Foeniculi	strat superior brun opalescență brună	pată brună
Salviae sclareae	portocaliu aprins	brun apoi violet
Melissae	gălbui	pată brună cu irizație violet
Lavandulae	verde apoi roșu- portocaliu cu inel galben	brun cu irizație roșie
Ocimi basilici	portocaliu pal	pată vernil cu irizație brună
Hyssopi	roz	pată brună cu irizație violet
Thymi	gălbui	pată gălbuie
Abiei albae	galben-brun	brun
Juniperi	roz	roz-violet
Pini montanae	gălbui	pată brună
Linalool	roz	pată roz
α -pinen	verzui, apoi galben	pată brună
β -pinen	galben-brun	pată brună

Molibdatul de sodiu reacționează specific cu uleiurile volatile din plantele din familia *Umbelliferae*, dând instantaneu o colorație albastră care dispare după câteva secunde, în timp ce uleiurile volatile din familia *Labiatae* reacționează cu tente albastre, violet sau chiar roșii, iar cele din ordinul *Coniferales* devin portocalii, brune după câteva secunde.

Reacționează cu 66% din uleiurile cercetate.

Albastrul de bromtimol dă reacții tot cu 66% din uleiurile volatile cercetate, provocând apariția de culori albastre sau verzi care la cald se decolorează de la albastru la verde și adeseori la galben. Cu *Anisi aetheroleum* și *Apii aetheroleum* dă culori galbene. Interesantă e regenerarea culorii verzi după răcire.

Cum era de așteptat reacția cu iodul, care se adresează compușilor nesaturați, se produce prin decolorarea reactivului

Ceilalți reactivi au o incidență prea redusă pentru a fi luați în considerare pentru capacitatea lor de a caracteriza această clasă de produse.

CONCLUZII

1. Tinctura de Alkanna și soluția de Sudan III sunt considerate până în prezent reactivi generali pentru uleiurile volatile, dar ele nu diferențiază aceste produse față de uleiurile grase.

2. În căutarea unor reactivi generali, au fost luate în lucru 15 uleiuri volatile alese la întâmplare, produse industriale în România.

3. Reacțiile chimice încercate s-au făcut pe soluții alcoolice cu 10% ulei volatil, în eprubetă, iar la anisaldehydă s-a lucrat în paralel și pe placă godet și pe hârtie de filtru cromatografică.

4. Acidul sulfuric, verdele de bromcrezol, anisaldehyda, clorura de litiu încercați în prima grupă ar putea fi considerați, prin comportarea lor ca reactivi generali și specifici ai uleiurilor volatile.

5. Dintre ceilalți reactivi, albastrul de bromtimol și molibdatul de sodiu dau reacții cu 2/3 din uleiurile volatile luate în studiu și pot fi luați în considerare pentru capacitățile lor analitice.

B I B L I O G R A F I E

1. GILDEMEISTER E., HOFFMANN Fr.-Die ätherischen Öle, Akademie Verlag, Berlin, 1960, Bd. 11-IIIa
2. GURWITSCH N., NEPARIDSE N.-Nefelometrische Bestimmung des ätherischen Ölgehaltes in Rosen und Basilikum Pflanzen, Masloboina zirovagiapromyslennost (1960), 26, 10, 22, după Miltitzer Berichte 1962, 251
3. MISRA R.C., KRISHNA G.-Oxidimetrisches Verfahren zur Bestimmung von flüchtigen Ölen in Gewürzen, J.Sci.Ind. Research (1938), 20D, 331, după Miltitzer Berichte, 1962, 252
4. MULLER A.-Neue Farbreaktionen von ätherischen Ölen, Journ.f.prakt. Chemie, N.F., (1938), 151, 233, după Schimmel Berichte, (1939), 139
5. PAECH K., TRACEY M.-Moderne Methoden der Pflanzenanalyse III, Springer Verlag, Berlin-Heidelberg-New-York, 1955
6. PHANG S., DUTT H.-Farbtest zur Unterscheidung der Früchte des chinesischen von japanischen Stenansibaum, J.Pharmacy Pharmacol (1962), 14, 108, Milititzer Berichte, (1962), 322
7. POPESCU H.-Medicamente de sinteză și extracție, Edit. Dacia, Cluj, 1985
8. POPESCU și col.-Analiza chimică a produselor naturale medicinale, Litografia IMF Cluj, 1981
9. RAZDAN T.-Parfümerie und Kosmetik (1984), 65, 190-195, după Miltitzer Berichte, (1984), 84
10. ROSENBERG G.-Wirkung von ätherischen Ölen auf verschiedene Metalle, Seifensieder Zeitung (1937), 64, 967, după Bericht der Schimmel und Co., (1938), 144
11. STAHL E.-Chromatogr. und Mikroskopische Analyse von Drogen, Gustav Fischer Verlag, Stuttgart, 1970
12. WILBAUX, NEYBERG-Wirkung von ätherischen Ölen auf Metalle und Legierungen, Bull.Agron. Congo Belge (1951), 42, 309, după Miltitzer Berichte, (1954), 90
13. Dyeing reagents for Thin Layer and Paper Chromatography, E.Merck, Darmstadt, 1984
14. Farmacopeea Română Ed.IX, Edit. Medicală, București, 1976

Medicina și farmacia din ținutul Putnei pe masa de disecție a istoriei

Dr. Virg. Paragină, farmacist Valeria Paragină
Editura "Porto-Franco", Galați, 1993, 183 p.

În ciuda a numeroase dificultăți, cei doi autori au publicat primul dintr-o serie de volume despre medicina și farmacia din vechiul ținut al Putnei, astăzi ținutul Vrancei.

Autorii, pornind din cele mai vechi timpuri până în anul 1925, au dat în 6 capitole unele date generale cunoscute din istoria medicinei românești, local greu de investigat, apoi date inedite despre practica medicinei și farmaciei în Vrancea.

Cartea cuprinde date despre paleopatologie, începuturile medicinei și farmaciei românești, demografie locală, organizare sanitară începând din secolul al XVI-lea, măsuri de urbanizare în Focșani, relații între serviciul sanitar local și cel general, trecutul epidemic, despre spitalele și asistența medicală din Focșani, din localitățile Adjud, Panciu, Odobești, Mărășești și la nivelul rural al Plasei Zăbrăuți-Putna și Vidra.

Practiciile farmaceutice, autorii îi rezervă 22 pagini și încheie cu elemente de deontologie medicală generală.

Date despre medicamente și slujitorii farmaciei se găsesc organic legate în tot volumul.

În "Postfață", se arată că autorii nu au găsit un precedent publicat despre tratarea istorică a asistenței medicale în vreo regiune a țării și de aceea lasă deschisă problema metodologiei.

Cartea are mare importanță medicală locală, din multe puncte de vedere și se cere cunoscută de un număr cât mai mare de cititori, mai ales din județul Vrancea.

C. I.

Metode de evaluare *in vitro* a disponibilității farmaceutice a sistemelor terapeutice transdermice cu membrană de control

SIMONA RAICU, ȘT. MOISESCU *, LELIA LAZĂR, ADRIANA SUCIU

Institutul pentru Controlul de stat al medicamentului și
Cercetări farmaceutice "Petre Ionescu Stoian", București
* Facultatea de Farmacie București

Rezumat

S-au întreprins cercetări comparative privind cinetica de cedare a nicotinei - considerată de noi o substanță activă test - din sisteme terapeutice transdermice cu membrană, produse de firma Ciba-Geigy, folosind dispozitive și condiții experimentale diferite.

Rezultatele au sugerat suplimentarea informațiilor cu experimente cinetice în care să se asigure condiții perfect "sink", care s-au realizat prin folosirea unui dispozitiv original.

Studiul efectuat a confirmat că cinetica de cedare din sisteme terapeutice transdermice este determinată de membrana sistemului și propune metode experimentale "echivalente" celor oficializate în controlul de calitate al acestor forme farmaceutice.

Summary

There have been performed comparative researches concerning the nicotine releasing kinetics - considered a test active substance - from transdermal therapeutic systems with a control membrane, manufactured by Ciba-Geigy, using different experimental devices and conditions.

The results suggested the supplementing of information with kinetic experiments, in which absolutely "sink" conditions should be ensured, fact that was possible by using an original device.

The present study has pointed out that the releasing kinetics from transdermal therapeutic systems is determined by the system membrane and it also proposes experimental methods "equivalent" to those specialized in the quality control of these pharmaceutical forms.

Sisteme transdermice

Evaluarea biodisponibilității farmaceutice

Evaluarea *in vitro* a biodisponibilității produselor cu cedare controlată a substanței medicamentoase, cu acțiune terapeutică sistemică, după aplicare dermică - SISTEME TERAPEUTICE TRANSDERMICE (STT) - se realizează prin metode

specifice acestui tip de forme farmaceutice.

Literatura de specialitate citează metodele Franz, Keschary-Chien și Valia-Chien, ca metode de cercetare, care folosesc ca dispozitive experimentale celule de difuzie tip Franz cu membrane biologice.

Teste *in vitro* mult simplificate au fost concepute și oficializate (USP) pentru evaluarea disponibilității farmaceutice a STT în controlul de calitate, respectiv metoda cilindrului rotativ și metoda paletelor peste disc.

Studiul acestor metode de testare *in vitro* demonstrează că sunt modele fizice, artificial concepute, cu grad mic de individualizare în funcție de particularitățile produsului.

SCOPUL LUCRĂRII

Lucrarea își propune efectuarea unui studiu comparativ al cineticii de cedare a **nicotinei** - considerată de către noi o **substanța activă test** - din STT cu membrană de control, produse de firma Ciba-Geigy Elveția, folosind dispozitive și condiții experimentale diferite.

Scopul experimentului este instituirea unei metode originale pentru controlul de calitate al acestor forme farmaceutice.

MATERIAL ȘI METODĂ

S-a luat în studiu produsul "NICOTINELL TTS 20 (35 mg; 20 cm²)" al firmei Ciba-Geigy, Elveția.

Dispozitive experimentale

S-a cercetat comportamentul cinetic de cedare al produsului prin metode cu agitare (convecție forțată) astfel :

- A -aparat pentru "testul de dizolvare" tip USP - prototip IAUC - cu paletă rotativă și disc ansamblu;
- B -aparat pentru "testul de dizolvare " tip USP - prototip IAUC - cu cilindru rotativ;
- C -aparat pentru "testul de dezagregare" tip USP - prototip IAUC
- E -aparat pentru "testul de dezagregare" ERWEKA tip ZT3U;
- F -agitator magnetic cu platformă termică; precum și metode statice (convecție naturală):
- D -platformă termică

S-au ales ca metode de referință cele oficializate de USP(A,B), iar prin schimbarea dispozitivului experimental și modularea parametrilor de lucru s-au obținut modele fizice experimentale notate (C,D,E,F) - fig.1.






Metode	Metode oficializate (ST) ST		Metode experimentale			
	Metoda paletei peste disc (A)	Metoda cilindrică (B)	C	D	E	F
Tipul de aparat						
Geometria vasului	- cilindru cu fund hemisferic	- cilindru cu fund hemisferic	- cilindru cu fund hemisferic	- cilindru cu fund plat	- cilindru cu fund hemisferic	- cilindru cu fund plat
Lichid de testare - natură	temperat furat de pH ~ 7,4	temperat furat de pH ~ 7,4	temperat furat de pH ~ 7,4	temperat furat de pH ~ 7,4	temperat furat de pH ~ 7,4	temperat furat de pH ~ 7,4
- volum	500	500	500	500	500	500
Agitare	- dispozitiv - probă în repaus; - mediu agitat cu probă rotativă	- dispozitiv - probă - mișcare de rotație	- dispozitiv - probă - mișcare de rotație pe verticală	- probă fixă	- dispozitiv - probă - mișcare de rotație pe verticală	- probă fixă; - mediu agitat prin mișcare orizontală
Intensitatea agitării	50 rpm	50 rpm	30 oscil./min.	-	40 oscil./min.	durată minimă
Temperatură	37°C	37°C	37°C	37°C	37°C	37°C
Temperatura prin:	baie de apă	baie de apă	baie de apă	current de aer cald (etern)	baie de apă	current de aer cald (etern)
Prelevări - volum	10 ml	10 ml	10 ml	10 ml	10 ml	10 ml
- interval de prelevare	1,2,3...24h	1,2,3...24h	1,2,3...24h	1,2,3...24h	1,2,3...24h	1,2,3...24h
- loc de prelevare	strat de mijloc, far de perete	strat de mijloc, far de perete	strat de mijloc, far de perete	strat de mijloc, far de perete	strat de mijloc, far de perete	strat de mijloc, far de perete

Fig.1. Metode in vitro experimentale - dispozitive și condiții experimentale

Rezultatele experimentale obținute prin aceste metode ne-au sugerat o nouă metodă care să poată suplimenta informațiile referitoare la cedarea substanței medicamentoase din STT. Metoda pe care o propunem în această lucrare asigură condiții perfect "sink".

REZULTATE ȘI DISCUȚII

Masele de substanță medicamentoasă cedate, în interval de 1-24 ore și evaluate cantitativ prin metode spectrofotometrice

în UV la $\alpha = 261 \text{ nm} \pm 2 \text{ nm}$, ne-au servit la înscrierea profilelor cinetice cumulative (integrale), corespunzătoare fiecăreia din metodele precizate anterior (fig.2).




Fig.2. Profile cinetice cumulative de cedare a nicotinei din produsul NICOTINNEL TTS 20 (35 mg; 20 cm²).

- Examinarea profilelor cinetice cumulative (integrale) de cedare demonstrează că forma lor este comparabilă pentru metodele cu agitație (A,B,C,E,F); de asemenea, metodele cu agitație experimentate sunt "echivalente" indiferent de intensitatea agitării.

- Se constată o cedare cu viteză crescătoare pe intervalul de aproximativ o oră de la primul contact al membranei STT (cedare favorabilă din punct de vedere terapeutic).

- După acest interval de timp, se instalează o cedare cu o viteză aproximativ constantă, remarcată pe grafic prin caracterul linear al cedării.

- Profilele cinetice cumulative pot fi descrise, după intervalul de 1 oră, de drepte ale căror pante reprezintă constante aparente de viteză de cedare.

- Pentru o evaluare exactă a acestor constante, am obținut prin metoda celor mai mici pătrate, ecuații care descriu cel mai bine aceste drepte (fig.3).




Fig.3. Profile cinetice cumulative de cedare liniarizate

- După o epuizare semnificativă a substanței active din rezervorul STT, corespunzătoare unui contact mai îndelungat cu lichidul test (18 - 19 ore), liniaritatea cedării în timp nu mai este respectată.

- Pe intervalele de timp în care cedarea se face controlat cu viteză constantă, masele de substanță cedate prin

metodele cu agitație, sunt comparabile, respectiv A - 75,37 %; B - 75,54 %; C - 75,54 %; E - 75,83 %; F - 75,43 % și ușor mai scăzute pentru metoda statică D - 67,37 %.

Pentru a constata în ce măsură cinetica cedării este determinată de viteza trecerii substanței active prin membrana STT, după cum am relatat anterior, am apreciat ca necesare experimente cinetice în care să se asigure condiții de cedare perfect "sink". Aceste condiții s-au realizat prin folosirea unei microcupe termostatate (fig.4) în care suprafața activă a STT este în contact static cu un volum minim de lichid de testare (23,2 ml apă distilată pH=5,4), care la intervale de timp bine precizate este înlocuit complet cu mediu de cedare proaspăt.




Fig.4. Schema dispozitivului experimental pentru evaluarea cedării în condiții "sink".

Profilul cinetic cumulativ (integral) înscris cu datele experimentale este comparabil cu cele obținute prin metodele cu agitare intensă (vezi fig.5).

- Se constată instalarea unei cedări cu viteză constantă după aproximativ o oră, ca și în cazurile precedente.

- Constanta vitezei de cedare ($K = 8,57 \times 10^{-4}$) are o valoare de 1,5 ori mai mare decât în cazul metodei B și este explicată de noi ca fiind datorată condițiilor "sink" pe care le oferă acest dispozitiv experimental.

- Ecuația dreptelor care aproximează cel mai bine profilele de cedare pe porțiunea liniară, prezintă, indiferent de metoda folosită, ordonată la origine (intercept), ceea ce ar putea sugera faptul că membrana sistemului este impregnată inițial cu substanța activă.




Fig. 5. Profil cinetic cumulativ (liniarizat) de cedare a nicotinei din produsul NICOTINELL TTS 20, în condiții "sink".

- Faptul că cedarea controlată de membrană nu este imediată, s-ar putea explica prin aceea că membrana sistemului este parțial impregnată sau că este necesară o perioadă de acomodare cu mediul de cedare.

- Constantele de viteză de cedare corespunzătoare

porțiunilor liniare ale profilelor cinetice cumulative de cedare comparabile ca valoare - indiferent de metoda experimentată - reprezintă un argument în favoarea ipotezei că procesul de cedare este determinat de viteza trecerii prin membrană.

CONCLUZII

1. Studiul comparativ al cineticii de cedare a nicotinei din produsul NICOTINELL TTS 20, atestă că cinetica de cedare din STT este determinată de membrana sistemului.

2. Datele experimentale obținute confirmă existența unor metode cu agitație "echivalente" cu metode oficializate și indicate în controlul de calitate al acestor forme farmaceutice.

3. Metoda propusă de noi, cu folosirea unui dispozitiv experimental pentru evaluarea cedării în condiții "sink", conduce la rezultate reproductibile și comparabile cu cele indicate în literatura de specialitate și în dosarul de reprezentare al firmei Ciba-Geigy.

4. Metodele experimentate în acest studiu pot fi generalizate și folosite la caracterizarea și a altor tipuri de sisteme terapeutice transdermice cu membrană de control.

B I B L I O G R A F I E

1. BURI, P.; PUISIEUX, F.; DOELKER, E.; BENOIT, J.P. - Formes pharmaceutiques nouvelles - "aspects technologique, biopharmaceutique et medical", Tec-Doc, Lavoisier, Paris, 1985 (III, VIII), 65-147, 385-404.
2. DUMITRESCU, A.M. - "Forme farmaceutice de administrare transdermală a medicamentelor", Practica Farmaceutică București, 1986, 63 - 67.
3. LANGGUTH, P.; MUTSCHLER, E.; HUBENER, K.-J. Pharm. Pharmacol., 1986, 38, 726-730.
4. LEUCUȚA, S. - "Sisteme farmaceutice de cedare cu viteză controlată și de transport la țintă", Practica farmaceutică, București, 1987, 27-32, 36-37, 98-103.
5. LEUCUȚA, S. - "Farmacocinetica în terapia medicamentoasă", Editura Medicală, București, 1989, 232-244.
6. SEGOT-CHICQ, S.; RIEG-FALSON, F. - S.T.P. Pharma, 1987, 3(4), 319-325, ("Les systemes transdermiques")
7. YIE W. CHIE, N. - "Developmental concepts and Practical in Transdermal Therapeutic Systems", U.S.A., 1987, 2, 25-79.
8. YIH-CHAIN HUANG - Evaluation of Transdermal Drug Delivery", U.S.A., 1987, 7, 159-177.
9. x x x NICOTINELL TTS - documentația firmei Ciba-geigy, Elveția, 1989 - 1992.
10. x x x U.S.P.XXI - N.F.XV.
11. x x x U.S.P.XII - N.F.XVI.

Tioureide N'-substituie ale acidului p-fenilsulfonilbenzoic. (Nota II)

AL. MISSIR, ILEANA CHIRIȚĂ, CARMEN LIMBAN

Facultatea de Farmacie București

Laboratorul de Chimie Farmaceutică

Rezumat

Se descrie sinteza unor noi tioureide N'-substituie ale acidului p-fenilsulfonilbenzoic, folosind reacția de condensare a acilizotiocianatului intermediar obținut cu diferite amine aromatice în mediu de acetonă anhidră. S-au stabilit condițiile de lucru necesare obținerii unor produși puri, cu randamente cât mai bune.

Noii compuși au fost caracterizați prin determinări cantitative ale elementelor constitutive și cu ajutorul spectrofotometriei în infraroșu.

Summary

The synthesis of some new N'-thioureides-substitutes for p-phenylsulphonylbenzoic acids is described, using the condensation reaction of the intermediary acylizothiocyanate, that was got using different aromatic amines in anhydrous acetone medium.

The necessary working conditions of better efficiency for getting some pure products have been established.

The new compounds were characterized by quantitative determinations of the constituent elements and by means of the infra-red spectrophotometry.

Tioureide.

Acid p-fenilsulfonilbenzoic.

În cercetările noastre anterioare am arătat importanța pe care o au pentru terapeutică compușii cu structură diarilsulfonică, cât și aceia care prezintă în moleculă un rest de tiouree /1-3/. De aceea, am continuat cercetările în ideea reunirii în aceeași moleculă a celor două structuri farmacologic active.

Pentru a putea sintetiza acești compuși cu structură tioureidică, derivați ai acidului p-fenilsulfonilbenzoic, a fost utilizată o metodă generală de sinteză aplicabilă la obținerea derivaților acilați ai tioureei /4-6/, condensând acilizotiocianatul difenilsulfonei cu diferite amine aromatice, metodă pe care am aplicat-o și în diferite alte lucrări ale noastre /7-9/.

PARTEA EXPERIMENTALĂ

Acilizotiocianatul difenilsulfonei a fost obținut prin reacția dintre clorura acidului p-fenilsulfonilbenzoic și tiocianat de amoniu și fără a fi izolat din mediul de reacție, a fost condensat în continuare cu diferite amine aromatice, în mediu de acetonă amhidrică, la reflux.

În tabelul I este menționată structura noilor compuși sintetizați, randamentul reacției, punctele de topire al compuşilor și solventul sau amestecul de solvenți utilizat la recristalizare.

Tabelul I

Date experimentale					
$C_6H_5-SO_2-C_6H_4-CO-NH-C(S)-NH-R$					
Nr.	R		Rdt%	PT°C	Solvent de crist.
I.	$-C_6H_3(OC_2H_5)$	(o)	40,9	177	n-C ₃ H ₇ OH
II.	$-C_6H_3(OC_2H_5)$	(m)	47,9	203	n-C ₃ H ₇ OH+(CH ₃) ₂ CO (2:1)
III.	$-C_6H_3(OC_2H_5)$	(p)	50,2	201	n-C ₃ H ₇ OH
IV.	$-C_6H_3(NO_2)$	(o)	52,3	170	n-C ₃ H ₇ OH
V.	$-C_6H_3(NO_2)$	(m)	56,8	210	n-C ₃ H ₇ OH+(CH ₃) ₂ CO (2:1)
VI.	$-C_6H_3(NO_2)$	(p)	52,3	205	n-C ₃ H ₇ OH+(CH ₃) ₂ CO (2:1)
VII.	$-C_6H_3(CH_3)(NO_2)$ (2,5)		46,3	215	n-C ₄ H ₉ OH
VIII.	$-C_6H_3(CH_3)(NO_2)$ (4,3)		50,6	307	n-C ₄ H ₉ OH

Rezultatele determinărilor cantitative ale elementelor (tabelul II) s-au încadrat în limitele erorilor experimentale admise, verificând astfel structura dedusă prin sinteză pentru noii compuși.

Tabelul II

Determinarea cantitativă a elementelor											
Nr. comp.	Formula moleculară	G.M.	C%	t/e	H%	t/e	N%	t/e	S%	t/e	
I.	C ₂₂ H ₂₀ N ₂ O ₄ S ₂	440,53	59,97	60,15	4,57	4,45	6,36	6,30	14,55	14,72	
II.	C ₂₂ H ₂₀ N ₂ O ₄ S ₂	440,53	59,97	60,28	4,57	4,35	6,36	6,52	14,55	14,32	
III.	C ₂₂ H ₂₀ N ₂ O ₄ S ₂	440,53	59,97	60,21	4,57	4,45	6,36	6,43	14,55	14,73	
IV.	C ₂₀ H ₁₅ N ₃ O ₅ S ₂	441,49	54,41	54,65	3,42	3,71	9,51	9,72	14,52	14,38	
V.	C ₂₀ H ₁₅ N ₃ O ₅ S ₂	441,49	54,41	54,58	3,42	3,36	9,51	9,75	14,52	14,70	
VI.	C ₂₀ H ₁₅ N ₃ O ₅ S ₂	441,49	54,41	54,62	3,42	3,58	9,51	9,32	14,52	14,38	
VII.	C ₂₁ H ₁₇ N ₃ O ₅ S ₂	455,5	55,36	55,60	3,76	3,58	9,22	9,15	14,07	14,25	
VIII.	C ₂₁ H ₁₇ N ₃ O ₅ S ₂	455,5	55,36	55,62	3,76	3,50	9,22	9,08	14,07	14,32	

- benzile caracteristice vibrației celor două nuclee

benzenice se află la 680-690 cm^{-1} .

- banda corespunzătoare vibrației de valență C...C este prezentă la 1480-1490 cm^{-1} .

- banda corespunzătoare vibrației de valență C=O (amidă I) este situată la 1660-1690 cm^{-1} .

- banda caracteristică vibrației de valență NH-asociat se găsește la 3320-3330 cm^{-1} .

- banda corespunzătoare vibrației de deformare a legăturii NH în planul legăturii se află la 1570-1580 cm^{-1} (banda amidă II suprapusă cu banda tioamidă B)

- la 720-730 cm^{-1} se află banda amidă V, corespunzătoare vibrației de deformare, perpendicular pe planul legăturii NH.

Confirmarea structurii chimice a fost făcută cu ajutorul analizei spectrale în infraroșu, care a pus în evidență atât structurile de bază (difenilsulfonică și tioureidică), comune tuturor compușilor, cât și prezența radicalilor specifici fiecărui compus sintetizat.

Gruparea sulfonil $-\text{SO}_2-$ este evidențiată prin trei benzi de absorbție corespunzând celor trei vibrații fundamentale: la 1140 cm^{-1} banda corespunzătoare vibrației de valență simetrică, la 1280 cm^{-1} banda corespunzătoare vibrației de valență asimetrică, iar la 580 cm^{-1} a treia bandă corespunzătoare vibrației de deformare a grupării sulfonil.

Sinteza tiourei N-/p-(fenilsulfonilbenzoil)/-N'-(o-etoxifenil)

La o soluție obținută prin dizolvarea la cald a 1,40 g (0,005 M) clorură a acidului p-fenilsulfonilbenzoic în 25 ml acetonă anhidră se adaugă, după răcire, soluția a 0,38 g (0,005 M) tiocianat de amoniu în 10 ml acetonă anhidră. Se refluxează amestecul de reacție timp de 30 minute, se răcește la temperatura camerei după care se adaugă în picături 0,65 ml (0,68 g) (0,005 M) o-fenetidină în 10 ml acetonă anhidră. Se refluxează din nou o oră, apoi se răcește amestecul de reacție și se toarnă în aproximativ 500 ml apă rece. Precipită o parte din produsul brut, iar pentru precipitarea totală se lasă amestecul timp de 24 ore la temperatura camerei. După esorare, produsul brut astfel format se purifică prin recristalizare din alcool n-propilic.

Se obțin 0,90 g (Rdt.=40,9 %) cristale prismatice strălucitoare slab galbene, p.t.=177°C, solubile la rece în acetonă și cloroform, la cald în primii patru termeni ai alcoolilor cu catenă normală sau ramificată, DMF, DMSO, benzen, toluen, xileni, insolubile în apă.

Pentru sinteza celorlalți compuși menționați în tabelul I s-a aplicat o tehnică de lucru similară celei descrise anterior, utilizând pentru fiecare caz cantitatea corespunzătoare de amină necesară a fi condensată cu acilizotiocianatul.

CONCLUZII

S-au sintetizat astfel noi tioureide N'-substituite ale acidului p-fenilsulfonilbenzoic.

Pentru fiecare compus în parte s-au stabilit condițiile de reacție necesare obținerii unor compuși cât mai puri, chiar în stare brută, cu bune randamente, precizându-se principalele lor constante fizice.

Structura noilor compuși, dedusă prin sinteză, a fost verificată cu ajutorul analizei cantitative a elementelor constitutive, confirmarea fiind dată de rezultatele spectrogramelor în infraroșu.

BIBLIOGRAFIE

1. FROMM E., WITTMAN J. - Ber. 1908, 41, 2264
2. KO OK HYNN - C.A. 1979, 91, 23, 193177 r
3. MAHTA K.J., PARICH A.R. - J.Inst.Chem.India, 1978, 50, 4,147-149 (1979,C.A. 91, 9, 74569 t)
4. DURANT S.J., SMITH G.N., SPICKETT R.G.W., WRIGHT S.B.H.-J.Med.Chem., 1966, 26
5. NURIDZHANYAN K.A., BULANOVA N.P., NESTEROVA L.M. - Zh.Org.Khem., 1967, 3, 2, 345-349
6. NURIDZHANYAN K.A., KUZNETSOVA G.V., BULANOVA N.P., NESTEROVA L.M. - Biol.Aktiv.Soedin. 1968, 6, 290 (1969 C.A. 71, 123768 e)
7. MISSIR Al., ZOTA V., SOARE JEANA, CHIRIȚĂ ILEANA - Farmacia, 1984, 32, 1, 53-57
8. CHIRIȚĂ ILEANA, MISSIR Al., CHIRIȚĂ Al. - Revista de Chimie, 1986, 37, 2, 157
9. MISSIR Al., CHIRIȚĂ ILEANA, LIMBAN CARMEN -Farmacia, 1992, 40, 1-4, 9-13

Contribuții la analiza dihidralazinei. Nota II. Noi metode de determinare cantitativă

CRINA-MARIA POPA, IOANA PRODAN

Facultatea de Farmacie București
Laboratorul de Chimie analitică

Rezumat

Reacțiile de precipitare ale dihidralazinei cu acizii silicowolframic și silicomolibdenic au permis instituirea unor metode de determinare gravimetrice, volumetrice (acido-bazice în mediu anhidru) și spectrofotometrice în vizibil.

Metoda acido-bazică are la bază dizolvarea silicowolframatului de dihidralazină în DMF și titrarea cu o soluție de metoxid de sodiu. În metoda spectrofotometrică se determină concentrația dihidralazinei prin reducerea silicomolibdatului de dihidralazină la albastru de molibden, cu clorură stanoasă.

Metoda spectrofotometrică a fost folosită cu bune rezultate la determinarea dihidralazinei din drajeurile de Hipopresol.

Summary

The techniques of new methods (gravimetric, volumetric and spectrophotometric) of quantitative evaluation of the dihydralazine are presented, based on acid and of the silicomolybdenum acids.

The results obtained, statistically processed, are reproducible, under small dosing errors.

The method was used, with good results, in dihydralazine evaluation of Hypopresol pills.

- Dihidralazina
- Determinare cantitativă

Dihidralazina (1,4 dihidrazinoftalazina) formează cu dodecawolframosilicatul de tetrahidrogen și cu dodecamolibdosilicatul de tetrahidrogen [1] combinații care prin solubilitatea redusă, masa moleculară mare și cantitatea mică de substanță necesară precipitării, au permis instituirea unor metode de determinare gravimetrică, dar și a unor metode volumetrice (acido-bazice) și fizico-chimice (spectrofotometrice), expeditivă, ușor de aplicat la analiza formelor farmaceutice.

Determinarea gravimetrică prin precipitare cu heteropoliacizi

Reacțiile de precipitare ale dihidralazinei cu acizii silicowolframic și silicomolibdenic în condițiile determinate de lucru pot servi dozărilor gravimetrice. S-a utilizat gravimetria rapidă, precipitatele fiind aduse la greutate constantă (după izolare prin creuzet filtrant G_4 și purificare), fie prin uscare în vid, fie în etuvă la $80-100^\circ\text{C}$, în condițiile indicate de curbele de termoliză efectuate.

Reactivi necesari : soluție apoasă de heteropoliacid 3%, acid clorhidric 2N, soluție saturată de precipitat.

Tehnica de lucru : se iau în lucru probe de circa 0,3 g substanță, se dizolvă în 100 ml apă distilată și se acidulează cu 10-15 ml acid clorhidric. Se precipită la temperatura camerei cu soluția de heteropoliacid, adăugată în porțiuni mici și sub continuă agitare până la precipitare cantitativă. Precipitatele se lasă în repaus aproximativ o oră, după care se separă prin creuzet filtrant G_4 . Se spală cu o soluție saturată de precipitat până când apele de spălare nu mai dau reacție pentru anionul Cl^- . Uscarea se face utilizând datele furnizate de analiza termică (Tabel I).

Tabelul I

Temperaturile de prelucrare și factorii gravimetrici calculați

Nr. crt	Formula precipitatului	Temp.de prelucrare	Factorul gravimetric
1.	$[\text{C}_8\text{N}_6\text{H}_{12}]_2\text{SiW}_{12}\text{O}_{40}4\text{H}_2\text{O}$	$t^\circ=90^\circ\text{C}$	0,11421
2.	$[\text{C}_8\text{N}_6\text{H}_{12}]_2\text{SiMo}_{12}\text{O}_{40}4\text{H}_2\text{O}$	$t^\circ=90^\circ\text{C}$	0,16715

Calculul se face ținând seama că la o moleculă de precipitat corespund două molecule de dihidralazină, utilizând factorii gravimetrici calculați.

Rezultatele obținute la dozarea gravimetrică a sulfatului de dihidralazină sub formă de dodecasilicowolframat sunt prezentate în tabelul II (vezi tabelul II).

Rezultatele obținute la dozarea gravimetrică a sulfatului de dihidralazină sub formă de dodecasilicomolibdat sunt prezentate în tabelul III.

Rezultatele obținute la determinări, prelucrate statistic în tabelele II și III arată că metodele instituite de noi sunt exacte, reproductibile, permițând determinarea unor cantități mici de substanță.

Rezultate experimentale

Tabelul II

Nr. crt.	Sulfat de dihidralazină luat în lucru (g)	Silicowolframă de dihidralazină (g)	Sulfat de dihidralazină		Datele prelucrării statistice
			g	%	
1.	0,2992	1,5000	0,2986	99,79	n=10 M=99,79 $\alpha=0,95$ $t_{\alpha}=2,262$ $s=\pm 0,163$ A=99,79 ($\pm 0,116$) $S_M=0,051$
2.	0,3025	1,5146	0,3015	99,66	
3.	0,3193	3,6025	0,3190	99,90	
4.	0,3019	1,5096	0,3005	99,53	
5.	0,3062	1,5392	0,3064	100,06	
6.	0,3054	1,5342	0,3054	100,00	
7.	0,2896	1,4519	0,2890	99,79	
8.	0,3009	1,5062	0,2998	99,63	
9.	0,3076	1,5132	0,3069	99,77	
10.	0,3018	1,5132	0,3012	99,80	

Tabelul III

Date experimentale

Nr. crt.	Sulfat de dihidralazină luat în lucru (g)	Silicomolibdat de dihidralazină (g)	Sulfat de dihidralazină		Datele prelucrării statistice
			g	%	
1.	0,3093	1,0512	0,3094	100,04	n=10 M=99,90 $\alpha=0,95$ $t_{\alpha}=2,26$ 2 $s=\pm 0,18$ 8 A=99,90 ($\pm 0,13$) $S_M=0,05$ 9
2.	0,3076	1,0462	0,3079	100,09	
3.	0,3196	1,0853	0,3194	99,93	
4.	0,3033	1,0257	0,3019	99,53	
5.	0,3009	1,0195	0,3000	99,70	
6.	0,3026	1,0290	0,3028	100,06	
7.	0,3006	1,0195	0,3001	99,83	
8.	0,3016	1,0259	0,3020	100,13	
9.	0,3113	1,0565	0,3110	99,90	
10.	0,2989	1,0141	0,2985	99,86	

Determinarea volumetrică acido-bazică în mediu anhidru
 Silicowolframatul de hidralazină se dizolvă cu ușurință în dimetilformamidă, solvent amfoteric protofilic, cu efect denivelator asupra bazicității dihidralazinei. DMF-ul nivelează funcția acidă a silicowolframului de dihidralazină făcând-o titrabilă cu o soluție de metoxid de sodiu. Acest

procedeu de determinare indirectă în mediu anhidru a fost realizat în laboratorul nostru de către prof.dr.Gheorghe Morait /2/., aplicat inițial la dozarea sărurilor de alcaloizi și apoi extins la numeroase substanțe cu funcție bazică și care formează combinații greu solubile cu heteropoliacizii.

Se precipită substanța după tehnica menționată la dozarea gravimetrică.

Reactivii necesari : acid silicowolframic soluție apoasă 3%, acid clorhidric 2N, soluție saturată de precipitat, acetonă, metoxid de sodiu 0,1 N, DMF purificat (prin trecere pe o coloană schimbătoare de ioni), albastru de timol soluție 0,5% în DMF.

Tehnica de lucru : 0,20 - 0,30 g dihidralazină se dizolvă în 50 ml apă distilată, adăugându-se 15 ml acid clorhidric 2N. Se precipită cu acid silicowolframic și se separă precipitatul după tehnica indicată la gravimetrie. După purificare, se spală cu acetonă. Se dizolvă direct pe creuzetul filtrant în circa 30 ml DMF, se adaugă 5-6 picături indicator și se titrează cu soluție de metoxid până la viraj roșu-brun ultim.

Pentru calcul s-a ținut seama că :

1 ml $\text{CH}_3\text{-ONa}$ 0,1N 0,016215 g sulfat de dihidralazină

Tabelul IV prezintă o parte din rezultatele obținute la dozare, prelucrate statistic.

Tabelul IV

Date experimentale

Nr. crt.	Sulfat de dihidralazină luat în lucru (g)	Soluție $\text{CH}_3\text{-ONa}$ 0,1 N (ml)	Sulfatul de dihidralazină găsit		Datele prelucrări statistice
			g	%	
1.	0,3015	17,10	0,3022	100,24	n=10
2.	0,3106	17,55	0,3101	99,86	M=100,09
3.	0,3256	18,50	0,3268	100,38	$\alpha=0,95$
4.	0,3478	19,70	0,3481	100,10	$t_\alpha=2,262$
5.	0,3537	20,10	0,3552	100,44	$s=\pm 0,229$
6.	0,3340	18,90	0,3340	100,01	A=100,09
7.	0,3002	17,00	0,3004	100,08	$\pm 0,16$
8.	0,3104	17,60	0,3105	100,21	$s_M=0,072$
9.	0,3005	16,95	0,2995	99,69	
10.	0,3111	17,60	0,3110	99,68	

Determinarea spectrofometrică în domeniul vizibil

Folosind reacția de precipitare a dihidralazinei cu acidul silicomolibdenic, am precizat condițiile unei noi metode de dozare spectrofotometrică în vizibil, după dizolvarea silicomolibdatului în DMF. Este știut că heteropoliacizii sunt folosiți la determinarea

spectrofotometrică a bazelor organice prin metoda "albastrului de molibden". Comlecşii substanţelor cu heteropoliacizii sunt reduşi cu diferiţi agenţi, în anumite condiţii la "albastru de molibden", intensitatea coloraţiei fiind măsurată spectrofotometric /3,4/

Pentru obţinerea albastrului de molibden am folosit metoda propusă de dr.Crina-Maria Popa /5/, utilizând ca agent de reducere clorura stanoasă dizolvată în DMF.

Soluţia astfel obţinută prezintă două maxime de absorbţie, unul la 646,4 nm, de mai slabă intensitate şi altul la 757,5 nm.

În vederea precizării condiţiilor de lucru s-a determinat variaţia absorbantelor în funcţie de lungimea de undă, de timp şi concentraţie. Determinările s-au făcut la un spectrofotometru de tip Spekord UV-Vis folosind cuve de 1 cm.

Urmărindu-se variaţia absorbantelor în funcţie de timp s-a constatat că cea de 646,4 nm se modifică, în timp ce a doua absorbantă de la 757,5 nm după 30 minute se menţine constantă 20 minute.

Am ales pentru efectuarea dozării spectrofotometrice absorbanta de la 757,5 nm la care s-a determinat domeniul de aplicabilitate a legii Lambert-Beer.

Reactivii necesari : acid silicomolibdenic soluţie apoasă 3%, acid clorhidric 2N, clorură stanoasă 3% în DMF (dimetilformamidă).

Tehnica de lucru : se cântăreşte la microbalanţă o probă de 0,008 g sulfat de dihidralazină, într-un pahar Berzelius, se dizolvă în 10 ml apă distilată, adăugându-se 2 ml acid clorhidric.

Se precipită cantitativ cu acid silicomolibdenic, se lasă în repaus 30 minute, se filtrează prin creuzet filtrant G₄, se spală până când apele de spălare nu mai dau reacţia pentru Cl⁻, se esorează şi se dizolvă direct pe filtru în DMF. Soluţia se culege într-un balon cotat de 50 ml completându-se la semn cu DMF.

Din această soluţie se pipetează în eprubete cu dop rodat volume cuprinse între 0,50 şi 2,30 ml, se adaugă 4 ml Sn Cl₂ şi se completează la 10 ml cu solvent. Fiecare diluţie se citeşte la spectrofotometru după un repaus de 30 minute.

Pe baza determinărilor efectuate, rezultă că legea Lambert-Beer este respectată cu exactitate în limite de concentraţie 0,008-0,0368 mg / ml.

Pentru calcularea absortivităţii s-au considerat punctele care se înscriu pe linia dreaptă (curba etalon) valoarea obţinută fiind de $E_{1cm}^{1\%} = 266,3$.

În tabelul V sunt prezentate datele experimentale prelucrate statistic prin metoda regresiei, metoda celor mai mici pătrate.

S-au determinat în continuare probe necunoscute de dihidralazină folosind tehnica descrisă la stabilirea curbei

etalon și s-a întocmit tabelul VI (vezi tabelul VI).

Tabelul V

Date experimentale

Nr. crt.	Dihidralazină luată în lucru (mg/ml) X	Absorbanta Y	Datele prelucrării statistice
1.	0,00800	0,210	n=10
2.	0,01120	0,300	X=0,02240
3.	0,01440	0,385	Y=0,597
4.	0,00760	0,470	$\sigma_x=9,1913000$
5.	0,02080	0,555	$\sigma_y=0,2449306$
6.	0,02400	0,640	r=0,9555665
7.	0,02720	0,725	
8.	0,03040	0,810	
9.	0,03360	0,895	
10.	0,03680	0,980	

Tabelul VI

Date experimentale

Nr. crt.	Sulfat de dihidralazină luat în lucru (mg)	Sulfat de dihidralazină găsit		Datele prelucrării statistice
		mg	%	
1.	0,009600	0,009590	99,89	n=10
2.	0,012800	0,012798	99,98	M=99,91
3.	0,016000	0,016003	100,01	$\alpha=0,95$
4.	0,019200	0,019211	100,05	$t_\alpha=2,262$
5.	0,022400	0,022389	99,95	$s=\pm 0,160$
6.	0,025600	0,025578	99,91	A=99,91
7.	0,032000	0,032010	100,03	($\pm 0,1625$)
8.	0,035200	0,035205	100,01	$s_M=0,05$
9.	0,038400	0,038345	99,85	
10.	0,040000	0,039801	99,50	

Determinarea dihidralazinei din forme farmaceutice : am luat în studiu posibilitatea aplicării metodei spectrofotometrice la produsul Hipopresol cu un conținut de 0,025 g substanță activă pe drajeu. Greutatea medie a unui drajeu este de 0,1499 g corespunzătoare la 0,025 g substanță activă.

Tehnica de lucru : se pulverizează la mojar drajeurile după îndepărtarea stratului de drajefiere (prin spălare cu apă distilată și uscare la etuvă la o temperatură de 40-45°C); se omogenizează . 0,4000 g pulbere de nuclee se introduc într-un

balon cotate de 100 ml și se agită cu 60 ml apă distilată fierbinte. 13,3 ml din filtrat se aduc într-un pahar Berzelius, se adaugă 2 ml HCl 2N și acid silicomolibdenic sub continuă agitare până la precipitare cantitativă. Se filtrează prin creuzet filtrant G₄, se spală până când apele de spălare nu mai dau reacția pentru Cl⁻; se dizolvă direct pe filtru în DMF; filtratul se culege într-un balon cotate de 50 ml. În continuare, se urmărește tehnica de lucru de la dozarea spectrofotometrică pentru substanța pură.

Tabelul VII prezintă o parte din rezultatele obținute la dozarea dihidralazinei din drajeuri prin metoda spectrofotometrică.

Tabelul VII

Date experimentale

Nr. crt.	Sulfat de dihidralazină luat în lucru (mg)		Sulfat de dihidralazină găsit		Datele prelucrării statistice
			mg	%	
1.	0,0064761	0,17	0,0063837	98,92	n=10 M=100,67 $\alpha=0,95$ $t_{\alpha}=2,262$ $s=\pm 0,44$ A=100,67 ($\pm 0,316$) $s_M=0,14$
2.	0,0093333	0,25	0,0093879	100,58	
3.	0,0123420	0,33	0,0123920	100,40	
4.	0,0153530	0,41	0,0153960	100,28	
5.	0,0183630	0,49	0,0184000	100,20	
6.	0,0213750	0,57	0,0214040	100,13	
7.	0,0243860	0,65	0,0244080	100,09	
8.	0,0273970	0,73	0,0274120	100,05	
9.	0,0304090	0,81	0,0304160	100,02	
10.	0,0334200	0,89	0,0334200	100,00	

CONCLUZII

Pe baza studiului calitativ efectuat asupra reacției de precipitare cu heteropoliacizi, s-au precizat tehnicile unor noi metode de determinare cantitativă.

Reacțiile de precipitare cu acidul silicowolframic și acidul silicomolibdenic au servit la determinări gravimetrice. S-au stabilit condițiile de reacție și prelucrare a precipitatelor pe baza datelor furnizate de analizele termice.

Rezultatele determinărilor au fost prelucrate statistic, fiind exacte și reproductibile, iar erorile de dozare sunt mici.

Capacitatea de precipitare a dihidralazinei cu heteropoliacizii luați în studiu a permis stabilirea unei metode de dozare acido-bazică indirectă în mediu neapos. S-a folosit ca solvent DMF, care datorită protofiliei sale denivelează

bazicitatea dihidrazinoftalazinei, în acest solvent manifestându-se numai funcția acidă a acidului silicowolframic (datorită anhidridei respective). Titrarea s-a efectuat cu metoxid de sodiu 0,1 N în prezența indicatorului albastru de timol. Rezultatele obținute evidențiază faptul că erorile de dozare volumetrice se înscriu în limitele admise pentru asemenea determinări.

S-au stabilit condițiile pentru o metodă de determinare cantitativă spectrofotometrică în domeniul vizibil după dizolvarea silicomolibdatului de dihidralazină în DMF și reducerea acestuia cu o soluție de SnCl_2 în DMF la albastru de molibden. Citirile absorbantelor s-au făcut la 757,5 nm. Rezultatele prelucrate statistic prin metoda regresiei evidențiază că r-coeficientul de corelație, are valoarea foarte apropiată de unitate, atestând independența liniară dintre concentrație și absorbant. Această metodă a fost folosită cu rezultate bune la determinarea dihidralazinei din drajeurile de Hipopresol.

B I B L I O G R A F I E

1. CRINA-MARIA POPA, IOANA PRODAN - Contribuții la analiza dihidralazinei - Nota I; Revista Farmacia 1992, 1-4, 47
2. GH. MORAIT - Teză de doctorat, I.M.F. București, 1969
3. G. GHEZI - Ann.Chim.(Roma), 1953, 43, 48
4. M. JEAN - Ch.analitique, 1962, 44, 5, 195
5. CRINA-MARIA POPA - Teză de doctorat, I.M.F. București 1978

Cercetări privind modificarea unor constante biochimice la șobolan sub influența a zece noi derivați de aril-sulfonil-tiobenzamida și derivați de aril-sulfonil-fenil-tiazoli

DENISA MIHELE, ELENA CRISTEA, ELENA BIVOL, IOANA ȘARAMET
Facultatea de Farmacie - București

Rezumat

S-au cercetat efectele biochimice ale unor derivați de aril-sulfonil-tiobenzamidă și derivați de aril-sulfonil-fenil-tiazoli, sintetizați la disciplina de Chimie Organică a Facultății de Farmacie, București.

S-a studiat influența asupra activității secretorii gastrice, s-au determinat în paralel modificările glicemiei, colesterolemiei și ale activității transaminazelor serice.

Două substanțe au scăzut semnificativ volumul conținutului gastric și aciditatea totală (S_9 și S_{10}). trei compuși au avut un efect similar, dar scăderea produsă a fost de numai 20-30% (S_4 , S_7 , S_5).

Atât glicemia cât și colesterolemia nu au prezentat scăderi semnificative din punct de vedere statistic.

Activitatea transaminazelor serice deși valoric e mai mare decât la martori, creșterile nu sunt semnificative din punct de vedere statistic.

Summary

The biochemical effects of some derivatives of aryl-sulphonyl-thyobenzamide and aryl-sulphonyl-phenyl-thiazole, synthesized during the classes of organic chemistry of the Pharmaceutics Faculty in Bucharest, have been studied.

There has been also studied the influence upon the gastrical secretory activity and simultaneously, the modifications of glycemia, cholesterolemia and serum transamines activity were determined.

Two substances determined the considerable decrease of the volume of gastric content and total acidity (S_9 and S_{10}). Three compounds had a similar effect but the decrease was only 20-30% (S_4 , S_7 , S_5).

Both glycemia and cholestelolemia did not present a significant decrease from a statistical standpoint.

The activity of serum transamines, although the value is higher on samples, presents no significant increases from a statistical standpoint.

- Tioamide, tiazoli
- Glicemie, colesterol, transaminaze

În vederea îmbogățirii arsenalului terapeutic, cercetările în clasa tiazolilor și tiadiazolilor /5,6,8/ au condus la obținerea de derivați în a căror moleculă au fost introduse cicluri aromatice disubstituite în poziția para. Dintre derivații obținuți, 10 substanțe au fost luate în studiu pentru stabilirea influenței lor asupra unor constante biochimice la șobolan.

Structura acestora este prezentată în tabelul I.

TABEL 1

STRUCTURA CHIMICĂ A SUBSTANTELOR STUDIAȚE

$$R_1-\text{C}_6\text{H}_4-\text{SO}_2-\text{C}_6\text{H}_4-\overset{\text{S}}{\underset{|}{\text{C}}}-R_2$$

Denumirea conventională	R ₁	R ₂
S ₁	H	-NH ₂
S ₂	Cl	-NH ₂
S ₃	Br	-NH ₂
S ₄	H	-NH-(CH ₂) ₃ -CH ₃
S ₅	Br	-NH-CH ₂ -CH(CH ₃) ₂
S ₆	H	-NH-CH ₂ -CH(CH ₃) ₂
S ₇	Cl	-N(CH ₂ -CH ₃) ₂
S ₈	Cl	-N

$$R_1-\text{C}_6\text{H}_4-\text{SO}_2-\text{C}_6\text{H}_4-R_2$$

S ₉	Br	
S ₁₀	Br	

Tioamidele și unii derivați tiazolici au intrat în terapeutică pentru efectele antimicrobiene, antihelmitice, mitostatice /5/, unii fiind activi ca sedativi și anticonvulsivanti, ca de exemplu clortiazolul (4-metil-5-(2-

cloretil)-tiazolul) sau ca analgezici și antipiretici cum este acidul fenclozic, acidul [(2-(p-clorfenil)-4-tiazolil]-acetic.

În lucrarea de față ne-am propus să studiem influența acestor noi substanțe asupra activității secretorii gastrice, asupra modificărilor glicemiei, colesterolemiei și ale activității transaminazelor serice, cercetări care vor fi necesare în eventualitatea în care compușii studiați au unele efecte farmacodinamice.

MATERIAL ȘI METODĂ

S-au utilizat suspensii apoase 1% din substanțele luate în studiu.

S-au luat în lucru 11 loturi a câte 8 șobolani masculi, repartizați uniform după greutate și ținuți la post 18 ore. După tratament cu substanțele de cercetat în doză de 50 mg/kg corp subcutanat, animalele au fost imediat narcotizate cu eter etilic și li s-a aplicat o ligatură la nivelul pilorului. Martorii au primit un volum egal de soluție fiziologică.

După 4 ore s-au sacrificat animalele, s-a recoltat sângele și s-a excizat stomacul deschizându-se pe linia mării curburi pentru recoltarea conținutului gastric. Acestuia, după centrifugare i s-a determinat volumul și aciditatea prin metoda Toppfer-Linossier /2/.

Glicemia a fost determinată prin metoda cu orto-toluidină /3/, iar colesterolemia colorimetric /2,3/.

Activitatea transaminazelor serice a fost cercetată folosind Merckotest (14330) constituit dintr-un kit pentru determinări fotometrice după Reitmann-Frankel /4/.

REZULTATE ȘI DISCUȚII

Aciditatea gastrică a fost scăzută de tratamentul cu substanțele S_9 (diminuare 48,11%), S_{10} (38,30%), S_5 (30,4%), S_4 și S_7 (20%).

Nu au influențat-o S_1 , S_6 și S_8 și au crescut-o nesemnificativ S_2 și S_3 (vezi tabelul II).

Glicemia la lotul martor a avut o valoare medie de 46,43 mg la 100 ml ser. Animalele tratate cu substanțele luate în studiu n-au prezentat modificări semnificative ale acestei constante biochimice.

Colesterolemia la animalele tratate a prezentat în medie creșteri sau scăderi nesemnificative față de lotul martor.

Activitatea transaminazelor serice a fost moderat crescută de tratamentul cu S_3 și S_8 și nu s-a modificat la loturile tratate cu majoritatea tioamidelor (vezi tabelul III).

Tioamidele studiate se diferențiază între ele prin substituenții din poziția para a nucleului aromatic, față de gruparea sulfonil ca și prin substituenții de la atomul de azot din gruparea tioamidică.

Dintre substanțele studiate, efect moderat de scăderea funcției secretorii gastrice au avut numai cele în molecula cărora s-a substituit un hidrogen al funcției amidă cu un radical alifatic normal sau ramificat (S_4 , S_5) sau 2 radicali etili (S_7). Cel mai intens efect hiposecretor gastric l-au prezentat compușii cu nucleu tiazolic obținuți prin ciclizarea tioamidelor de tip S_3 . Acești compuși sunt substituiți în poziția 2 cu un rest de difenilsulfonă, iar în poziția 4 cu radicalul fenil sau parabrom-fenil.

Se pare că o influență deosebită asupra activității biologice a acestor compuși o are crearea de noi sisteme aromatice ca π excesive care includ cei doi heteroatomi, azotul și sulful (S_9 și S_{10}).

Cercetările au fost orientate și pentru stabilirea influenței asupra glicemiei datorită existenței în molecula tuturor compușilor a radicalului aril-sulfonil liber sau substituit în poziția para cu un atom de halogen.

Compușii studiați, neinfluențând semnificativ nivelul glicemiei la animal, se pare că această grupare nu este suficientă pentru a induce un efect hipoglicemiant cum au sulfamidele antidiabetice utilizate în terapeutică /1,7/.

Activitatea transaminazelor serice n-a fost semnificativ modificată de către compușii tioamidici, iar în cazul tiazolilor, compusul S_9 pare a produce o moderată scădere, probabil prin includerea atomului de sulf într-un heterociclu.

Tabelul II

Influența unor tioamide asupra secreției gastrice la șobolan

Subst.	Doza mg/kg s.c	Volumul conținutului gastric ml/100 g	Efect %	Aciditate totală mEq/l	Efect %
S_1	50	4,15	0	13,40	0
S_2	"	5,10	20	15,58	10,24
S_3	"	4,45	0	15,12	11,60
S_4	"	2,91	31,5	10,08	20
S_5	"	2,55	40	9,43	30,40
S_6	"	4,43	0	13,26	0
S_7	"	2,91	31,5	10,87	19,77
S_8	"	3,83	9,88	13,15	0
S_9	"	3,03	28,70	7,03	48,11
S_{10}	"	3,20	24,70	8,36	38,3
Martori	-	4,25	-	3,55	-

Tabelul III

Influența unor tioamide asupra glicemiei, colesterolemiei și transaminazelor serice la șobolan

Subst.	Glicemie mg/100 ml	Colesterolemie mg/100 ml	GOT	GPT
S ₁	56,16±3,3	98,60± 5,8	55,40±6,3	20,25±1,6
S ₂	61,66±4,7	90,40± 8,6	53,40±4,8	18,75±1,9
S ₃	54,62±5,8	93,60± 7,5	78,00±3,9	30,66±2,5
S ₄	53,00±3,5	124,00±10,4	58,00±7,1	21,05±1,6
S ₅	42,00±2,8	111,00± 9,2	61,35±8,3	19,40±0,9
S ₆	48,10±3,9	127,00± 1,5	67,20±5,8	18,10±2,1
S ₇	50,00±4,1	116,00± 0,92	55,90±4,2	23,14±3,4
S ₈	43,90±5,2	101,00± 0,75	69,00±8,1	26,30±2,3
S ₉	48,02±4,1	100,30± 6,30	52,00±4,8	15,00±0,6
S ₁₀	57,12±6,1	97,40± 8,1	66,00±7,5	16,90±0,8
Martori	46,43±3,5	115,25± 7,4	66,00±4,7	18,00±2,1

CONCLUZII

Din cele 10 substanțe cercetate, se evidențiază compuși S₉: [2-(4'-fenilsulfonil-fenil)-4-(4"-Br-fenil)]-tiazol și S₁₀: 2-[4'-(4"-Br-fenilsulfonil-fenil)-4-fenil]-tiazol, care produc un efect hiposecretor gastric marcat.

Trei compuși au avut același efect, dar scăderea a fost în medie de 25%, S₄: N-propil-4-(fenilsulfonil)-tiobenzamidă; S₅: N-izobutil-4-(4'-Br-fenilsulfonil)-tiobenzamidă și S₇: N, N-dietil-4-(4'-clor-fenilsulfonil)-tiobenzamidă.

Substanțele nu au modificat semnificativ glicemia, colesterolemia și activitatea transaminazelor serice.

BIBLIOGRAFIE

1. DOBRESU D. - Farmacologie, Ed. medicală Buc. 1981
2. DOBRESU D., ELENA CRISTEA, LUCIA MURGU, AURELIA CRISTEA - Farmacodinamie. Lucrări practice. Litog. I.M.F.Buc.1978
3. DENISE MIHELE, ELENA BIVOL - Chimie medico-sanitară. Lucrări practice, vol.1. Litog.I.M.F.Buc.1991, 29
4. REITMANN S., FRANKEL S.-Amer.J.Clin.Path.1957, 28, 5.
5. ȘARAMEI I.- Teză de doctorat, Bucuresti 1981
6. ȘARAMEI I., ELENA BADAU - Farmacia 1989, 37 (4), 247-252
7. STROESCU V. - Bazele farmacologice ale practicii medicale. Editura Medicală, Buc., 1984
8. ȘARAMEI I., NEGAI M., NEAGOE S., ELENA BĂDĂU - Farmacia,1991, 39 (1-4), 28.

Butlleti de la Societat d'Amics de la Historia i de la Ciència Farmaceutica Catalana (BSAHCFC)

Nr.2, Anul II, 1993, Barcelona, 62 p.

Printre puținele reviste în domeniul istoriei farmaciei care apar în Occident cum este și "Revue d'Histoire de la Pharmacie" din Franța care apare din anul 1913, acum a apărut încă una, cea mai nouă, cu titlul de mai sus. Anul apariției BSAHCFC este 1992. Director responsabil este Dl.Prof.Dr.Ramon Jordi Gonzàles din Barcelona, prieten al farmaciștilor români, animatorul mișcării de istoria farmaciei din Catalonia - veche provincie a Spaniei.

Revista cuprinde numeroase materiale din care extragem: editorial, informare despre adunarea generală a Societății Prietenilor Istoriei și Științei Farmaceutice din Catalonia, lista de conturi financiare la 31.XII.1992., note informative, lucrări științifice și scurte relatări, cuvinte încrucișate adecvate, colaborări, cărți apărute și altele.

Revista este importantă din multe puncte de vedere, printre altele aducând vești despre mișcarea de Istoria farmaciei din România (pag. 12, 16-17), precum și despre înfrățirea dintre SAHCFC și SRIF.

Conținutul este variat și accesibil, textele fiind în limbile catalană și de circulație mondială, revista națională având scopul să devină și internațională.

Revista se găsește la Facultatea de Farmacie București, la disciplina de Istoria Farmaciei.

C. IUGULESCU

Cărți anunțate de edituri străine pentru anul 1993 :

- **British Pharmacopeia** 1993 (2 vol, 1800 p) - va cuprinde circa 2000 de monografii vechi și noi
- **British Pharmacopeia (Veterinary)**, 1993, aproximativ 500 p. Cuprinde "standarde" pentru medicamentele veterinare.
- **Martindale "The Extra Pharmacopeia"**, Ediția 30-a, 1993
- **British National Formulary (BNF)**, 1993, aproximativ 600 p.
- **Harold Hamacher, Prof.Dr.Barbara Kessel: SELBST MEDICATION**, circa 800 p.
- **Karl-Arthur Kovar: PHARMAZEUTISCHE PRANS**, circa 500 p. , 100 figuri, 110 tabele
- **Midha-Blume: BIO-INTERNATIONAL**, (cuprinde lucrările Conferinței FIP "Bio-International 1992 "), Hamburg, circa 240 p.
- **SINONIM-VERZEICHNIS**, 1992, 425 p.
- **Ritschil W.A. Cincinatti SUA: HAND BOOK OF BASIC PHARMACOKINETICS**, Ediția a IV-a, 588 p.

Formularea și prepararea unor comprimate de supt destinate tratamentului local al infecțiilor buco-faringiene

RODICA MUNTEAN, VOICHIȚA MUREȘANU, DOINA ROMANA POP*
C. POLINICENCU, V. CHIOREAN**

*Institutul de Cercetări chimico-farmaceutice, Cluj

**Universitatea de Medicină și Farmacie, Facultatea de Farmacie, Cluj

Rezumat

Datorită avantajelor pe care le prezintă, comprimatele pentru supt sunt utilizate tot mai mult în tratamentul local al afecțiunilor buco-faringiene. În scopul obținerii unor comprimate cu activitate antimicrobiană și antifungică superioară, am utilizat ca principii active: ambazona, violetul de gențiana și boratul fenilmercuric.

Sunt prezentate formulele și procedeele de preparare pentru realizarea acestor comprimate.

Comprimatele obținute posedă parametri de calitate superiori, manifestă o bună stabilitate în timp și pot fi industrializate.

Summary

Due to their advantages, the swallow tablets are used on a large scale in local treatment of buccal-pharyngeal diseases.

In order to get some tablets of superior antimicrobial and antifungoid activity the active principles were used, such as : ambazone, violet of gentian and phenylmercuric borate.

There are presented the formula and preparation procedures of getting these tablets.

The obtained tablets present superior qualitative parameters, are durable and can be industrialized.

Resumé

Les comprimés à suche sont utilisés, de plus en plus dans le traitement des affections bucco-pharyngiennes grâce aux avantages qu'ils présentent. Nous avons utilisé comme principes actifs l'ambazone, le violet de gentiane et le borat phénylmercurique afin d'obtenir des comprimés à action antimicrobienne et antifongique supérieure.

On présentent les formules et les procédés de préparation pour obtenir ces comprimés, qui possèdent des paramètres de qualité supérieure, manifestant une bonne stabilité à la longue et peuvent être industrialisés.

- Ambazona, violet de gențiană, borat de fenilmercur
- Acțiune antimicrobiană

Comprimatele orale (de supt) reprezintă una dintre formele farmaceutice utilizate tot mai mult în tratamentul


local al afecțiunilor buco-faringiene. Datorită substanțelor active pe care le conțin: antiseptice, dezinfectante, antibiotice, anestezice locale, vitamine, emoliente, antiinflamatoare(1), comprimatele orale pot fi utilizate atât în tratamentul curativ, cât și în cel profilactic.

Acest tip de comprimate este preferat altor forme farmaceutice în tratamentul mucoasei buco-faringiene, deoarece asigură un contact prelungit cu mucoasele lezate, ceea ce duce la asigurarea unui efect medicamentos prelungit, manifestă stabilitate bună în timp și se utilizează cu succes în pediatrie atât pentru administrarea comodă cât și pentru gustul plăcut pe care îl conferă.

În lucrarea de față ne-am propus realizarea unor comprimate de supt care conțin antiseptice buco-faringiene înzestrate cu acțiune terapeutică superioară, care să acopere întreaga gamă a infecțiilor cavității buco-faringiene.


MATERIAL ȘI METODĂ

S-au preparat comprimate de supt care au ca substanțe active: ambazonă, violet de gențiană și fenil-mercuriborat. Ambazona (1,4 benzochinonamidinohidrazontiosemicarbazona) /2,3/ are formula brută $C_8H_{11}N_7S \cdot H_2O$ și de structură:




Este o pulbere microcristalină brună cu reflexe arămii, fără miros și fără gust, solubilă în metanol, foarte puțin solubilă în alcool etilic, practic insolubilă în apă.

Violetul de gențiană (clorura de metilrozanilină) /3,4/ cu formula de structură:



Se prezintă ca o pulbere cristalină verde-închis, cu luciu metalic, fără miros, solubil în apă, alcool, cloroform și glicerină, practic insolubil în eter.

Boratul fenilmercuric (merfen, mercasept, fenosept) /3,4/ are formula de structură:



Este o pulbere microcristalină albă sau alb-gălbuie, fără miros, cu gust astringent, metalic, greu solubilă în apă, puțin solubilă în alcool și glicerină.

Comprimatele au fost preparate după metoda generală de preparare a comprimatelor, ținând cont de influența unor factori de formulare asupra calității comprimatelor pentru supt /5/ .

Pentru realizarea comprimatelor s-a folosit mașina de comprimat cu excentric, cu un ponson de $\phi=14$ mm.

Determinarea parametrilor de calitate (timp de dezagregare, rezistență mecanică și friabilitate) s-a efectuat conform F.R. IX și tratatelor de specialitate.

Comprimatele realizate au fost testate comparativ din punct de vedere microbiologic, pe germeni Gr+, germeni Gr- și fungi.

PARTEA EXPERIMENTALĂ

La prepararea comprimatelor am utilizat metoda granulării umede.

Ca lichid de granulare am folosit alcool etilic de 95°, ca diluanți: zahăr, amidon și lactoză, ca aglutinanți: gumă arabică și polivinilpirolidonă, ca lubrifianti: stearat de magneziu și acid stearic, ca edulcoranți: zahăr, ciclamat de sodiu și zaharină sodică, iar ca substanțe aromatizante: cacao, scorțișoară, vanilină, mentol și oleu de mentă (vezi tabelul I).

Comprimatele cu ambazonă realizate de noi (proba 1) se prepară după următorul procedeu : principiul activ, ambazona (adus la gradul de finețe al sitei IX se omogenizează cu zahărul, lactoza și cacao (adusă la gradul de finețe al sitei VI), cu o parte din aglutinanți: gumă arabică și 70% din polivinilpirolidonă și cu stearatul de magneziu. Amestecul obținut se granulează cu o soluție de alcool etilic de 95° în care s-au dizolvat 30% din polivinilpirolidonă și vanilina. Granulatul obținut se usucă la 40-50°, se uniformizează, apoi se comprimă.

Comprimatele de supt cu ambazonă - sub denumirea industrială "FARINGOSEPT" - sunt utilizate cu succes în tratamentul local al infecțiilor acute ale cavității bucale și ale căilor respiratorii superioare cum sunt: stomatite, gingivite, angine, etc. O deficiență importantă în realizarea acestor comprimate o constituie insolubilitatea principiului activ în solvenții uzuali de granulare, ceea ce duce la utilizarea acestuia sub formă de pulbere, adusă la un grad de finețe cât mai avansat, care nu este ușor de realizat. Acest fapt influențează negativ aspectul comprimatelor (care apar mai mult sau mai puțin marmorate), cât și efectul terapeutic.

Tabelul I

Date experimentale

Materii prime	Formule				
	1	2	3	4	5
Ambazonă	1	1	-	1	1
Violet de gentiană	-	-	-	1	-
Borat fenilmercuric	-	-	0,03	-	0,03
Zahăr	74,90	73,80	94,46	78,20	75,87
Lactoză	15	15	-	15	15
Amidon	-	5	-	-	-
Cacao	5	-	-	-	5
Gumă arabică	1	1	2	1	1
Polivinilpirolidonă	1	1	2	1	1
Acid stearic	-	-	1	-	-
Stearat de magneziu	2	2	-	1,50	1
Ciclamat de sodiu	-	1	-	1	-
Zaharină sodică	-	0,10	-	-	-
Scortişoară pulbere	-	-	-	0,30	-
Vanilină	0,10	0,10	-	-	0,10
Alcool etilic 95°	15	5	15	12	15
NN'-dimetilformamidă	-	5	-	-	-
Mentol	-	-	0,01	-	-
Oleu de mentă	-	-	0,50	-	-
T O T A L	100	100	100	100	100

Timp de dezagregare (min.)	40	45	35	50	44
Rezistență mecanică(kgf/cm ²)	10	10,6	9,8	11,3	12,17
Friabilitate (%)	0,80	0,80	1	0,70	0,97

În scopul obținerii unor comprimate cu activitate antimicrobiană superioară și de aspect mai bun, am realizat un procedeu de preparare prin care am solubilizat ambazona în NN'-dimetilformamidă (Formula 2) /7/. Se procedează astfel: cantitățile prescrise de zahăr, lactoză, amidon, gumă arabică, stearat de magneziu, ciclamat de sodiu, zaharină sodică, vanilină și 0,7% din cantitatea de polivinilpirolidonă, aduse în prealabil la gradul de finețe al sitei VI, se omogenizează. Ambazona se dizolvă în cantitatea de NN'-dimetilformamidă prescrisă și se amestecă cu o soluție formată din restul cantității de polivinilpirolidonă dizolvată în alcool etilic de 95°. Cu această soluție se amestecă masa de granulare. Granulatul obținut, se usucă la 50-60°C, se omogenizează și apoi se comprimă. Rezultă comprimate cu un aspect uniform și acțiune antimicrobiană superioară.

Deficiența comprimatelor cu ambazonă o constituie faptul că sunt lipsite complet de activitate antifungică (tabelul II-proba 1 și 2). Sunt însă infecții buco-faringiene care necesită un tratament complex atât antimicrobian, cât și

antifungic, fără a avea o rezolvare satisfăcătoare cu ajutorul acestor preparate.

În acest scop, ne-am propus realizarea unor comprimate de supt care să posede și proprietăți antifungice, prin asocierea unei substanțe dotată cu proprietăți antifungice. Comprimatele conțin ca principii active ambazonă și violet de gențiană în raport de 1:1 (proba 4) /8/.

Pentru obținerea acestor comprimate se omogenizează zahărul cu lactoza, guma arabică, polivinilpirolidonă, stearatul de magneziu și ciclamatul de sodiu (aduse în prealabil la gradul de finețe al sitei VI), cu ambazonă și scorțișoara (aduse în prealabil la gradul de finețe al sitei IX). Violetul de gențiană se dizolvă în alcool etilic de 95°, soluție utilizată pentru obținerea masei de granulat. Granulatul obținut se usucă la 40-50°C, se omogenizează și apoi se comprimă. Rezultatele testărilor microbiologice sunt prezentate în tabelul II.

Tabelul II

Date experimentale

Microorganismul utilizat	Probe (ϕ în mm)				
	1	2	3	4	5
Staphilococcus aureus	19	20	26	22	26
Streptococcus haemoliticus	22	22	-	22	22
Escherichia coli	20	21	16	20	26
Candida albicans	-	-	28	15	28

Aceste comprimate prezintă dezavantajul colorării mucoasei bucale, de aceea, în continuare ne-am preocupat de prepararea unor comprimate, care să aibă ca principiu activ boratul fenilmercuric în cantitate de 0,3 mg/comprimat (formula 3).

Modul de preparare al acestor comprimate este următorul: cantitatea de zahăr prescrisă (sita VI) se omogenizează cu gumă arabică și polivinilpirolidonă. Boratul fenilmercuric și acidul stearic se dizolvă în cantitatea de alcool etilic de 95° prescrisă și se adaugă peste amestecul obținut, amestecându-se până la omogenizare. Granulatul care se obține se usucă la temperatura de 50°C. Peste el se adaugă mentolul și oleul de mentă, se omogenizează, apoi se comprimă.

În urma testărilor microbiologice efectuate (tabelul II) se constată că aceste comprimate posedă o activitate antifungică foarte bună, superioară comprimatelor prezentate anterior (formula 4), dar sunt lipsite complet de activitate asupra streptococului β -hemolitic, atât de frecvent întâlnit în infecțiile buco-faringiene.

În această situație ne-am propus realizarea unor com-

primate care să conțină ca principii active ambazonă (10mg/compr.) și borat fenilmercuric (0,3 mg/comprimat) (formula 5) /9/.

Cantitățile prescrise de zahăr, lactoză, cacao, gumă arabică și stearat de magneziu (aduse în prealabil la gradul de finețe al sitei VI) se amestecă cu ambazona (sita IX). Separat se prepară soluția de granulare prin dizolvarea la 25°C a boratului fenilmercuric, a polivinilpirolidonei și a vanilinei în alcool etilic de 95°. Granulatul rezultat se usucă la maximum 50°C, se omogenizează și apoi se comprimă.

În urma testărilor microbiologice efectuate s-a constatat că aceste comprimate au o activitate antimicrobiană și antifungică superioară, comparativ cu celelalte comprimate testate.

CONCLUZII

- Substanțele active utilizate la realizarea comprimatelor de supt au fost: ambazona, violetul de gențiană și boratul fenilmercuric;

- Comprimatele au fost realizate după metoda clasică a granulării umede;

- Comprimatele ce conțin numai ambazonă au activitatea antimicrobiană bună, dar sunt lipsite complet de activitatea antifungică;

- Comprimatele cu ambazonă și violet de gențiană posedă activitate antimicrobiană și antifungică, dar prezintă dezavantajul de a colora mucoasa bucală;

- Comprimatele cu merfen au activitate antifungică superioară, dar sunt complet lipsite de activitate asupra streptococului β-haemolitic;

- Comprimatele care conțin ambazonă și borat fenilmercuric au activitate antimicrobiană și antifungică superioară, acoperind întreaga gamă a infecțiilor buco-faringiene.

BIBLIOGRAFIE

1. STĂNESCU V.-Comprimate farmaceutice, Ed. Medicală., București, 1972.
2. XXX-Farmacopeea Română Ed. a IX-a ,102.
3. FELICIA DANCIU-Chimie farmaceutică, Litografia I.M.F.-Cluj-Napoca 1978, 39, 115, 123.
4. XXX-Farmacopeea Română Ed. a VIII-a 19, 441, 530.
5. I.BAN, C.POLINICENCU, S.LEUCUȚĂ, RODICA MUNTEAN-Clujul Medical 1981, LIV, 4, 337.
6. Brevet R.S.R nr. 78480 (1981).
7. Brevet R.S.R nr. 81168 (1982).
8. Brevet R.S.R nr. 81169 (1982).
9. Brevet R.S.R nr. 82913 (1983).

250 de ani de la atestarea documentară a primei farmacii orădene

GHEORGHE MERMEZE

Farmacia "ANGEFARM" Aleșd, Jud. Bihor

Rezumat

Prin existența ordinelor călugărești din Oradea, se consideră începutul activității farmaceutice în secolele XIII-XIV.

Potrivit unor istorici mai vechi (1882), prima farmacie orădeană s-ar fi înființat între anii 1670-1780.

Din cercetarea întreprinsă de autor rezultă existența unei mențiuni despre un farmacist, încă din anul 1720, care nominalizat în anul 1742, Ioannes Stacho (senior), solicită înnobilare pentru serviciile farmaceutice aduse orășenilor.

Farmacia "Crucea de Aur", care funcționa cu certitudine în anul 1771, este menționată și în alt document, datat din 1773.

În decursul a peste 220 de ani, la această farmacie se perindă mai mulți proprietari, se naționalizează în 1949 sub denumirea de Farmacia nr.1 (proprietate de stat), iar din 1990 devine farmacia "DELIAFARM" S.C., în același local.

Summary

Owing to the existence of the priests' orders in Oradea, it is considered as the beginning of the pharmaceutical activity during the XIII-XIVth centuries.

According to some older historians (1882), the first pharmacy was set up between 1670-1780 in Oradea.

From the author's research results the existence of a mention about a pharmacist, still from 1720, who, nominated in 1772, Ioannes Stacho (senior) solicits to be ennobled for his pharmaceutical services in the benefit of his town people.

The "Golden Cross" Pharmacy, that certainly functioned in 1771, is also mentioned in another document from 1773.

During above 220 years, this pharmacy had more owners; in 1949 it is notionalized under the name Phearmacy Nr.1 (state property), and from 1990 it becomes "DELIAPHARM" S.C. Pharmacy, in the same building.

- Istoricul unei farmacii
- Secolul al XVIII-lea

Dezvoltarea cercetărilor medico- și farmaco-istorice din ultimii ani au scos la lumină o serie de aspecte inedite ale ocrotirii sănătății din țara noastră.

Despre istoria ocrotirii sănătății din Oradea, așezare

urbană datând din secolul al XII-lea, puternic centru industrial și economic, focar al culturii românești, s-a scris relativ puțin ori fără contribuția cadrelor medico-sanitare și farmaceutice bihorene, istoria medicinei naționale rămânând lacunară. De aceea, ne-am propus catagrafierea și prelucrarea istoricului farmaciilor din acest vechi centru cultural.

Istoricul farmaciei orădene își are începuturile sale încă din secolele XIII-XIV, fiind strâns legată de activitatea desfășurată de ordinele călugărești existente aici.

Din păcate însă, documentele arhivistice de până în anul 1660 ale orașului Oradea și ale Comitatului Bihor au căzut pradă distrugerilor provocate de turci, după ocuparea cetății. De aceea, informațiile noastre sunt foarte parcimonioase. Cu siguranță că în această perioadă trebuie să fi luat ființă primele farmacii propriu-zise, asemănătoare cu cele cunoscute din orașele Principatului Transilvania. Ideea poate fi susținută și de afirmațiile apărute în lucrările unor istorici mai vechi potrivit cărora prima farmacie orădeană "Crucea de Aur" ar fi fost întemeiată între anii 1670-1680 /1/, deci în perioada ocupației turcești, fără însă a se menționa vreun document de bază.

Prima informație certă despre această veche farmacie orădeană datează din anul 1734, când pe seama uniților orădeni (români de religie greco-catolică) se cumpără un teren și o casă în piața orașului capitular, învecinate cu farmacia /2/.

Probabil că, la această dată, oficina să fi aparținut lui Ioannes Stacho senior, deoarece în anul 1742 el solicită înnoibilarea sa pentru nenumărate "servicii aduse comunității prin farmacia sa". Ori, pentru a putea să solicite o asemenea diplomă era necesară o activitate anterioară, îndelungată și susținută, în măsură să determine organele conducătoare ale vremii să-i răsplătească meritele deosebite.

Cert este și faptul că un document din anul 1720 atestă existența în Oradea propriu-zisă a unui farmacist care, probabil, să fi fost același cu proprietarul viitoarei farmacii "Crucea de Aur" /3/. Deci, în stadiul actual al cercetărilor putem pune începutul farmaciei de mai sus, cu mare probabilitate, în jurul anului 1720, față de 1742. Din păcate, izvoarele arhivistice referitoare la problema farmaciilor pentru această perioadă de timp sunt destul de sărace. Documentul următor, care se referă în mod explicit la această officină, datează din anul 1771, când este amintită inspectarea farmaciei "Crucea de Aur", aceasta constituind totodată o primă mențiune privind denumirea oficinei /4/.

În anul 1773, farmacia este controlată de medicul șef al comitatului, Franciscus Sievers /5/.

Familia nobilă Stacho a mai deținut o farmacie în Oradea - Olosig, probabil cumpărată după anul 1773, odată cu desființarea ordinului Iezuit, când se pare că farmacia "Fortuna" a fost vândută de autorități.

După moartea lui Joannes Stacho, farmacia "Crucea de Aur" intră în proprietatea fiului său care în schimbul a 22000 florini o cedează farmacistului Philipus Müller /6/. Nu după mult timp, acesta decedează, iar farmacia rămâne soției lui care pentru continuarea activității angajează un farmacist și un administrator, oameni foarte pricepuți, după cum rezultă din procesul verbal de inspecție din anul 1784. Farmacia a avut un important rol în această perioadă în distribuția de medicamente nu numai în orașul Oradea, ci și în întregul comitat.

De la doamna Freud Katalin, farmacia a fost cumpărată de farmacistul Brands Mihaly, în anul 1796 /8/. Greutățile de ordin financiar îl antrenează pe Brands în datorii pe care nu este în stare să le achite, ceea ce determină comitatul să-i sechestreze farmacia în anul 1800 /9/, numind ca administrator pe farmacistul Joseph Schmidt.

Dintr-o declarație a farmaciștilor orădeni din anul 1801, aflăm însă că Brands se oferă să furnizeze "mizerilor"-deținuți și săraci, medicamente la jumătate de preț /10/, lăsând să se înțeleagă că el este încă de fapt proprietarul, cel puțin până în anul 1804 când farmacia este scoasă la licitație și cumpărată ca o prăvălie oarecare aducătoare de venituri, de către meșterul Demeter M. cu suma de 7001 florini renani /11/. Noul proprietar, neavând cunoștințele necesare, renunță repede la farmacie, în favoarea farmacistului Joseph Schmidt. Timp de peste 3 decenii, această farmacie s-a aflat în posesia lui Joseph Schmidt, care la fel ca și predecesorul său, va obține înnobilarea în anul 1835, schimbându-și numele în Kovacs.

În toată această perioadă, farmacia și-a păstrat locul de frunte în Oradea, controlul unor comisii conduse de medicii șefi ai comitatului (în anii 1806, 1811, 1824, 1826, 1828) găsind-o de fiecare dată bine aprovizionată și în bună ordine /13/.

Tot în 1835, îl găsim pe farmacistul Joseph Kovacs fost Schmidt, angrenat în lupta dusă cu alți farmaciști orădeni pentru împiedicarea înființării unei noi farmacii în oraș din fondurile marelui prepozit orădean Ioannes Tagen, pe seama spitalului comitatului. Prepozitul condiționa donația sa de permisiunea deschiderii unei farmacii în spital și a alteia în oraș de către farmacistul Folinus Stephanus, care la rândul lui promitea aprovizionarea cu medicamente a spitalului, în mod gratuit, pe o perioadă de 10 ani.

Kovacs, împreună cu alți 3 farmaciști orădeni : Stephan Schwachffer, Rudolph Majlatth și Joseph Hoffman, prezintă un memoriu adunării generale a comitatului pentru a împiedica înființarea noii oficine, motivându-și refuzul prin argumentul că la o populație de 15000 locuitori, cele 4 farmacii existente sunt îndestulătoare, mai ales că, dispoziția Consiliului Locotenențial dispunea ca la o farmacie să revină cel puțin 6000 de locuitori. La rândul lor, se angajau să aprovizioneze spitalul cu medicamente în mod gratuit timp de

10 ani. La puțin timp, în anul 1836, Kovacs fost Schmidt decedează, oficina revenind fiului său Kovacs Jozseph junior care o va deține până în anul 1844 /14/. În anul următor, farmacia are un nou proprietar, în persoana farmacistului Bercsinsky Karoly /15/, personalitate cu merite excepționale în organizarea de mai târziu a Asociației profesionale a Farmaciștilor bihoreni. Vânzarea farmaciei este anunțată Consiliului Locotenențial abia în anul 1847, care va aproba tranzacția în anul 1848. Cu ocazia inspecțiilor anuale din partea medicului șef al orașului, pe lângă problemele generale de aprovizionare, dotare, curățenie și personal, se amintește în mod deosebit că farmacistul posedă toate instrucțiunile farmaceutice, farmacopeea austriacă, taxa de medicamente vieneză, precum și regulamentul referitor la practicarea profesiei.

Pentru asigurarea unei aprovizionări cât mai bune, farmacistul completa în mod regulat defectura într-un registru special. Drogurile erau procurate de la angrosistul Mayerhoffer Karl. Aprecierile controlului sunt în general laudative. Insuși medicul șef recunoaște că farmacia are cel mai bun renume, iar publicul îi acordă deplină încredere, deservirea fiind punctuală și taxarea cât se poate de corectă. "Proprietarul, conchide raportul, este un om cultivat, studios și harnic, personalul inteligent și priceput" /16/.

Farmacistul și proprietarul Bercsinsky, prin întreaga sa activitate desfășurată în mod conștiincios, menține ani în șir farmacia sa la un loc fruntaș. El și-a câștigat aprecierea superiorilor, a medicilor șefi, precum și a colegilor farmaciști. Farmaciștii din Bihor îl vor alege ca președinte al asociației lor și îl vor împuternici în anul 1866 să se adreseze Corporației farmaciștilor din Debrețin în vederea aderării lor, fiind ales și vicepreședinte, funcție pe care o deține până în anul 1874.

Ultimul proces verbal de inspecție a farmaciei lui Bercsinsky, datat din 5 noiembrie 1875, face referiri la personalul unității, pregătirea lui, enumeră substanțele verificate, calitatea lor, precum și la inventarul bibliotecii în materie de actualități făcându-se sublinierea că printre cărțile de specialitate se află și prima ediție a Farmacopeei Maghiare din anul 1871.

După moartea lui Bercsinsky, farmacia trece în proprietatea soției și fiicei sale, iar pentru conducerea ei este menținut ca provizor Hering Sandor, pentru ca în anul 1878 acesta să o ia în arendă /18/. Nu cunoaștem data până la care Hering Sandor a arendat farmacia, dar în 1915 ea era administrată de farmaciști delegați. În anul 1916, farmacistul Nemeth Pal devine proprietar al farmaciei rămânând la conducere până la 15 decembrie 1925 când vinde farmacia pentru suma de 625000 lei lui Zsigmondovici Geza, care o va conduce pe întreaga perioadă interbelică /19/.

La 7 iunie 1946, farmacistul Zsigmondovici Geza, prin

donatie, predă nepotului său farmacistul Masznyic Geza întreaga farmacie, iar Ministerul Sănătății îi transcrie farmacia la 8 iulie 1946 sub numărul 22852 /20/.

Rămas până la naționalizare ca proprietar /21/, farmacistului Masznyic Geza i se va încredința în perioada următoare conducerea altei farmacii din Oradea (Farmacia nr. 3), funcție pe care o va deține până la pensionarea sa survenită în anul 1985.

Farmacia "Crucea de Aur", cea mai veche instituție de acest fel din oraș, a fost cunoscută sub denumirea de Farmacia nr.1 până în anul 1990 când datorită noilor transformări din țara noastră a primit denumirea de S.C."Deliafarm", sub care funcționează și acum.

B I B L I O G R A F I E

1. ROTHSCHNEK V. EMIL -Istorie de la înființarea farmaciilor, corporațiilor și asociațiilor din Corporația farmaciștilor din Debrețin și Comitatul Bihor și din Circumscripția III Plasa IV, din Asociația generală a farmaciștilor din Ungaria, Debrețin, 1882.
2. Arhivele Statului Oradea, Fond Episcopia Greco-catolică de Oradea, Acte pe probleme, dos.1114.
3. Arhivele Statului Oradea, Fond Prefectura Jud.Bihor, inv.41, dos.159.
4. Idem, dos.793, f.293.
5. Idem, Fond Parohia Romano-catolică Oradea, 1774, Fasc.I,65.
6. Idem, Fond prefectura Jud.Bihor, inv.41, dos.793, F.293
7. Idem, dos.791, f.46-104.
8. Idem, dos.793, f.293 si dos.792, f.1148-1149 (contractul de vânzare)
9. ROTHSCHNEK V. EMIL - op.cit., 143.
10. Arhivele Statului Oradea, Fond Parohia romano-catolică,1801, Fasc.VI,4.
11. Idem, Fond Prefectura Jud.Bihor inv.41, dos.793,f.293.
12. Idem.
13. Arhivele Statului Oradea, Fond Parohia romano-catolică Oradea, 1806, Fasc.VIII, 27, 1812, Fasc.VI, 39, 1824, Fasc.VI, 29, 1829, Fasc.VI,51.
14. Idem, Fond prefectura Jud.Bihor, inv.41, dos.793, 293.
15. Idem.
16. Idem, Fond Primăria Municipiului Oradea, inv.141, dos.258, f.18-22.
17. Idem, Fond Primăria Municipiului Oradea, inv.141, dos.258, f.105-109
18. Idem, f.111-115.
19. Almanahul farmaciștilor, Cluj, 1924, 115.
20. Informații oferite de farmacistul Masznyic Geza.
21. Dosarul cu naționalizarea farmaciilor.

Relații farmaceutice România-Spania

- În 1991, la Barcelona s-a înființat Societatea Prietenilor Istoriei și Științei Farmaceutice Catalane (Societat d'Amics de la Historia i de la Ciència Farmaceutica Catalana), președinte Prof. Dr. Ramon Jordi Gonzales. Societatea a publicat în primul număr al buletinului său (BSAHCF) statutele, precum și articole de istoria și științele farmaceutice. Farmaciștii români sunt invitați a trimite lucrări spre publicare.

- S-a convenit ca între Societatea Română de Istoria Farmaciei (SRIF) și La SOCIETAT d'AMICS DE LA HISTORIA I CIENCIA FARMACEUTICA CATALANA (SAHCFC) să se stabilească relații frățesti. Astfel, membrii activi ai celor două societăți vor putea lua parte la ședințe, vor putea publica articole, vor putea purta corespondențe, ca fiind din aceeași mare familie. Membrii celor două societăți vor avea aceleași drepturi cu excepția alegerii organelor de conducere. Ei nu vor plăti decât cotizația pentru societatea proprie.

- La Barcelona a apărut buletinul Societății de Istoria farmaciei catalane: "Butlleti de la Societat d'Amics de la Historia i Ciència Farmaceutica Catalana" în care sunt înscrise articole științifice de istoria farmaciei. Între știrile despre mișcarea științifică europeană și universală sunt cuprinse în context european și vești din țara noastră. SAHCFC ne-a expediat, prin schimb, un exemplar care se află la dispoziția cititorilor noștri (vezi recenzia din numărul viitor).

- SAHCFC invită farmaciștii români la zilele științifice de istoria farmaciei catalane: "Primeros Jornades d'Historia de la farmacia Catalana" ce vor avea loc la Barcelona la 23 și 24 octombrie 1993. Doritorii se vor adresa : SAHCFC c/Provença, 366-1 cr a, 08037 Barcelona, Spania.

- Dl. Prof. Dr. R. Jordi, președintele SAHCFC și redactorul responsabil al buletinului a adresat salutări colegilor români, prin buletinul de istoria farmaciei (BSAHCF) nr.

- Sub titlul de "Efemeride", Butlleti information vol. XXIII, nr. 257, iunie 1992 și XXIV, nr. 265, martie 1993 publică date importante despre istoria farmaciei spaniole și universale din perioada anului 600 Av. J. Cr. - până la sfârșitul secolului al XVII-lea.

- Dl. Prof. Dr. R. Jordi a expediat pe adresa Societății române de Istoria Farmaciei 6 extrase publicate, cuprinzând subiecte de istoria farmaciei spaniole, îndeosebi catalane.

Analiza receptorului pentru medicamente

STEVEN J GOLDIN

Ann.Clin Brochem 1992; 29; 132-136

Prima analiză a unui receptor de medicamente a fost descrisă încă din 1966 de Lowenstein și Corrill, dar de atunci s-au făcut progrese foarte mici.

Unul din motive ar putea fi slaba înțelegere a avantajelor oferite de analizele receptorului față de obișnuitele încercări imunologice monoclonale specifice.

Teoretic, analiza receptorului pentru medicament este oricând avantajoasă. Un medicament (activ sau inactiv din punct de vedere farmaceutic) este convertit în metaboliți care au diferite grade de activitate farmaceutică.

Exemple de acest tip sunt digoxina și ciclosporina.

În aceste situații, un anticorp monoclonal specific care reacționează numai cu medicamentul, nu va cuantifica metaboliții farmacologici activi.

Un anticorp policlonal poate să reacționeze încrucișat și cu metaboliți activi și inactivi; gradul reactivității încrucișate nu pare să depindă de activitatea farmacologică.

De exemplu, metabolitul agliconic al digoxinului, digoxigenina, nu este reactiv, dar interacționează semnificativ în majoritatea determinărilor imunologice.

Intr-adevăr, unul din avantajele potențiale ale analizelor de receptori față de analizele imunologice este că reactivitatea încrucișată a metaboliților în încercările cu receptor poate exista în paralel cu activitatea farmacologică, astfel încât analizele de receptor pot da un indicator al activității.

Aceasta se pare că este cazul pentru metaboliții digoxinei.

N.M.

Interferonul, o cale directă până la gene

FRANÇOIS BOISSIR

La Recherche, 1993, 250, vol. 24, 86 - 89

Când o celulă este pusă în prezența interferonului alfa, sunt activate unele din genele sale.

Grație unor lucrări recente, este posibil acum să urmărim acțiunea interferonului din exteriorul celulei până la cromozomi.

Legându-se la receptorul său, interferonul activează o enzimă asociată membranei celulare (tirozin - kinaza). Această enzimă fixează gruparea fosfat pe trei proteine prezente în citoplasmă, care se asociază și migrează în interiorul nucleului. Acolo se grefează o a patra proteină pentru a forma un complex activ, factorul de transcripție ISGF₃. Acest factor interacționează cu ADN; se fixează pe o regiune reglatoare (ISRE), situată în apropierea genelor reglate de interferon și activează exprimarea lor.

Una din proteinele factorului de transcripție poate fi vizualizată datorită unor anticorpi fluorescenți în cultură de celule umane.

Proteina se găsește în mod normal în citoplasmă; putem urmări migrarea ei în nucleu când se adaugă interferon.

Această cale foarte directă explică rapiditatea efectelor interferonului asupra genelor și constituie un mecanism model pentru transmiterea a numeroase alte semnale între celule.

N.M.

A N U N Ţ U R I

În curând va apare Farmacopeea Română Ed. a X-a.

Înscrierile se fac la Institutul de Stat pentru Controlul Medicamentelor și Cercetări Farmaceutice "Petre Ionescu-Stoian" din București.

- Societatea Română de Științe Farmaceutice Filiala București ține ședințele științifice în ultima joi din lună, orele 13 la Facultatea de Farmacie, Str. Traian Vuia Nr. 6, Amfiteatrul IV/7. Înscrierea lucrărilor se va face din vreme. Se reamintește că taxa de înscriere în societate este de 30 lei, iar cotizația 1000 lei.

- Societatea Română de Istoria Farmaciei anunță organizarea celei de a doua Reuniuni Științifice de Istoria Farmaciei în zilele de 27 - 28 august 1993, la Pitești și Ștefănești, Județul Argeș.

- Revista "FARMACIA" apare în 1993 cu o tematică mai bogată și variată, cât mai aproape de interesul general la farmaciștilor. Costul unui abonament este de 1600 lei. El se va depune individual sau centralizat prin colegiile farmaceutice județene la Asociația Medicală Română (și filialele sale), în cont 45.10.7.06.2 B.C.R., S.M.B. (Pentru revista "FARMACIA") - str. Progresului, Nr. 10, București, Sector 1, cod poștal 70.754.

BREVIAR

La 5 martie 1993 la București a avut loc ședința Consiliului director al Societății Române de Științe Farmaceutice.

Cu această ocazie s-au stabilit principalele detalii referitoare la organizarea celui de-al X-lea Congres Național de Farmacie, care va avea loc la Cluj-Napoca în septembrie 1994.

De asemenea, s-au discutat și probleme referitoare la modul de apariție a noilor numere ale revistei "FARMACIA" ca unică revistă a societății. S-a ales noul colegiu de redacție al revistei "FARMACIA" (vezi coperta).

- La 1 mai a.c., dl. profesor Dr. Al. Mavrodin a împlinit 94 ani. Cu acest prilej a primit felicitări de la numeroșii săi prieteni din țară și străinătate. Amintim că dl. profesor este membru de onoare al Societății Române de Științe Farmaceutice și a numeroase societăți și academii din țară și străinătate.

- În zilele de 3-7 mai a.c., s-a ținut la Heidelberg al XXXI-lea Congres Internațional de Istoria Farmaciei.

- La rubrica intitulată "Din relațiile culturale farmaceutice Spania-România din revista noastră 1-4/1992 s-a omis din eroare numele d-lui Prof. Dr. D. Dobrescu, membru al Academiei Regale de Farmacie din Spania.

- În zilele de 25 și 26 mai a.c. a avut loc la Facultatea de Farmacie din București aniversarea a 70-a de la înființare. Cu această ocazie s-au organizat două zile de comunicări științifice orale și poster.

- În zilele de 25 și 26 iunie a.c. s-a organizat la București a XXVII-a Reuniune Națională de Istoria Medicinii, la care au luat parte și farmaciști.

- În zilele de 4-6 iunie 1992 s-a desfășurat la Brașov "Zilele Internaționale ale medicamentului și tehnicii informatice" de către Asociația Română „Farmaciști fără Frontiere” și „Pharmaciens sans Frontieres” - Misiunea internațională. Au participat cadre didactice din Franța, Belgia, Elvetia și peste 150 farmaciști români. S-au discutat probleme ale farmaciei din perioada de tranziție.

1. The first part of the report is a general introduction to the subject of the study.

2. The second part of the report is a detailed description of the methods used in the study.

3. The third part of the report is a discussion of the results of the study.

4. The fourth part of the report is a conclusion and a list of references.

5. The fifth part of the report is a list of appendices.

6. The sixth part of the report is a list of figures and tables.

7. The seventh part of the report is a list of footnotes.

8. The eighth part of the report is a list of abbreviations.

9. The ninth part of the report is a list of symbols.



Principalele medicamente pe care le oferă **SINDAN** sînt: *Aminoglutethimida, Dacarbazina, Clanisen, Lomostina, Melphalan, Methotrexat, Tretinoin, Thiotepa, Tamoxifen, Ciclofosfamida, Cisplatin, 5-Fluorouracil, Vincristina, Aminofilina, Farmorubicina.*

În afara produselor standard sintetizăm orice formulă conform dorințelor specifice transmise, în condițiile garantării parametrilor structurali, prin toate analizele necesare.

SINDAN utilizează serviciile unei echipe de specialiști, cu peste 20 de ani de experiență, în domeniul sintezei organice fine. Aria competențelor noastre include reacții ale compușilor organo-metalici, acilări, protecție-de protecție ale grupărilor funcționale, reacții Friedel-Crafts, reduceri și oxidări selective, sinteze de compuși optic activi etc.

Dotarea modernă de care dispunem ne permite să răspundem prompt oricărei solicitări; dispunem de 22 reactoare cu diferite capacități, care facilitează condiții de lucru deosebite, la temperaturi și presiuni ridicate.

Standardele de calitate sînt competitive pe plan internațional, specificațiile fiind conforme USP XXII. Acest fapt este posibil datorită echipamentului analitic folosit: spectrometre IR, UV, RMN, AAS, cromatografe HPLC, GC, scanner computerizat, sintetizator și secvențiator automatizate pentru peptide etc.

SINDAN: B-DUL. 1 MAI NR. 11, BUCUREȘTI, TELEFAX: 312.02.49.



WADSWORTH

1842

1843

1844

1845

1846

1847

1848

1849

1850

1851

1852

1853

1854

1855

1856

1857

1858

RECOMANDARI PENTRU AUTORI

Colaboratorii revistei sunt rugați să țină seamă de următoarele recomandări privind modul de redactare a articolelor;

- Să fie trimise în două exemplare dactilografiate (corectate în întregime, adică și bibliografia), scrise la două rânduri, cu marginea stângă liberă de 3-4 cm, cu 31 rânduri pe pagină.

- **Articolul** să fie concis, nedepășind 10 pagini pentru referate generale, 6-8 pagini pentru studii și cercetări și 1-3 pagini pentru prezentare de medicamente, tehnici de laborator, etc.

- **Titlul** articolului să fie cât mai concis; autorii, trecuți în ordinea aportului, nominalizați astfel: numele de familie precedat de inițiala prenumelui, iar pentru autoare numele de familie precedat de prenumele scris în întregime; denumirea instituției unde a fost efectuată lucrarea.

- **Rezumatul** în limba română nu va fi mai mare de 15 rânduri (1000-1200 caractere). Rezumatul va fi tradus în limba engleză pe o coală separată, având și titlul și autorii (eventual și în limba franceză).

- **Textul** articolelor originale este de dorit să fie redactat în sistemul recomandărilor internaționale: introducere (în care se arată stadiul actual al problemei, premisele și scopul studiului); metode (de lucru) și materialele studiate; rezultatele obținute; discuții; concluzii. Utilizarea inițialelor se face numai după o primă prezentare a întregii denumiri, urmată în paranteză de inițiale. Este de dorit ca rezultatele să fie redactate în unități de măsură convenționale.

- **Iconografia** să cuprindă tabele numerotate prin cifre latine, și grafice, scheme, fotografii și figuri, numerotate prin cifre arabe (fotografiile vor fi în alb-negru și nu mai mari de 9 x 12 cm, iar figurile de aceleași dimensiuni vor fi redactate pe hârtie de calc în tuș negru). Tabelele vor avea trecut titlul sus și legenda jos. Figurile, fotografiile, tabelele etc vor avea trecută legenda pe un borderou de iconografie, dactilografiat pe o foaie separată.

Autorii vor indica în text locul unde trebuie plasată iconografia (ex.: vezi tabelul I, vezi fig.1 etc.)

- **Bibliografia** va fi selectivă și exclusiv cea cercetată în mod nemijlocit.

Articolele din reviste se numerotează în ordinea intrării în text, astfel: numele autorilor (când sunt mulți se trec primii apoi "și colab."), titlul articolului (de dorit în limba originală), revista (trecută în prescurtarea admisă pe plan internațional), anul, volumul și numărul, prima și ultima pagină.

Pentru cărți: autorii, titlul în limba originală, editura, orașul, anul și specificarea capitolului sau paginilor la care se face referirea.

Ordinea în care vor apărea în revistă articolele este determinată de data intrării în redacție, necesități editoriale și de priorități.

- **Recenziile** de cărți și referatele despre articole nu trebuie să fie mai mari de 1 pagină, la fel și informațiile despre manifestările științifice și despre activitatea filialelor.

CONTENTS	pag.
<i>Researches on defining a new ointment bas</i> ANETA VERBUȚĂ, MARIA GROSU	3
<i>Copper complex combinations with β-lactamic type antibiotic</i> VICTORIA ALDEA	9
<i>Use of some chromatografic reagents for identification of complete volatile oils.</i> INGRID LUX, H. POPESCU	15
<i>Methods for in vitro evaluation of the pharmaceutical availability of the transdermal therapeutic systems with a control membrane.</i> SIMONA RAICU, ȘT. MOISESCU, LELIA LAZĂR, ADRIANA SUCIU	25
<i>N'-Thyoreides-substitutes for p-phenylsulphonylbenzoic acide. Note II.</i> AL. MISSIR, ILEANA CHIRIȚĂ, CARMEN LIMBAN	33
<i>Contributions to the analysis of dihydralazine, new methods of quantitative evaluation. Note II.</i> CRINA-MARIA POPA, IOANA PRODAN	37
<i>Researches on modification of some biochemical constant values on white rats under the influence of 10 new deriva- tes of aryl- sulphonyl-thyobenzamide and derivates of aryl- sulphonyl-phenyl-thyazole</i> DENISA MIHELE, ELENA CRISTEA, ELENA BIVOL, IOANA ȘARAMET	45
<i>Formulation and preparation of tablets designed for local treatment of buccal-pharyngeal infections.</i> RODICA MUNTEAN, VOICHIȚA MUREȘAN, DOINA- ROMANA POP, C. POLINICENCU, V. CHIOREAN	51
<i>250 years from the documentary certification of the first Pharmacy in Oradea.</i> GH. MERMEZE	57